

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر های ژنتیکی

عباس دوستی، سعادت مشکلانی

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
adleishmania@yahoo.com

چکیده

تعیین جنسیت اغلب پرنده‌گان تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتاً مشکل است. اما جنسیت پرنده‌گان و سایر جانوران از بد و تشکیل نطفه، به لحاظ ژنتیکی معین است. امروزه با پیشرفت روش‌های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می‌باشد. در تحقیق حاضر تعیین جنسیت در قناری با استفاده از واکنش PCR و براساس دو ژن CHD-W و CHD-Z شرح داده شده است. در این تحقیق جمعاً از ۲۹ قطعه قناری استفاده شد. استخراج DNA از انتهای کلاموس پر قناری های زنده صورت پذیرفت و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده در این طرح، واکنش PCR تنظیم گردید. نتایج نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های ۳۰۶ و ۳۴۵ جفت باز برای جنس ماده و فقط یک باند ۳۰۶ جفت باز برای جنس نر بود. این نتایج برای کلیه نمونه های پر مشاهده شد. از آنجا که طراحی این سیستم تعیین جنسیت برای اولین بار در قناری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتایج مولکولی با ویژگی های مورفولوژیک دو جنس نر و ماده کاملاً مطابقت دارد، لذا تعیین جنسیت جوجه های قناری با انجام واکنش PCR روی نمونه های پر، آسان، سریع، بی خطر و ارزان می‌باشد.

واژه های کلیدی

تعیین جنسیت ،
نشانگر های ژنتیکی ،
قناری ،
PCR

مقدمه

قناری ها (*Serinus canaria canaria*) از جمله زیباترین پرنده‌گان خانگی هستند که از زمان های بسیار دور نگهداری آنها به خاطر آواز دلنشیں و رنگ آمیزی زیبایشان رایج شده و مورد توجه مردم سراسر دنیا قرار گرفته است. طبق دسته بندي سیستماتیک زیست شناسی، قناری وحشی به راسته گنجشک ها (*Passeriformes*) و به خانواده فنچ ها (*Fringillidae*) تعلق دارند. با توجه به اینکه قناری ها از زمان بلوغ شروع به آواز خواندن می‌کنند و صدای زیبای قناری ها بیشتر توسط جنس نر تولید می‌شود، به همین دلیل جنس نر این پرنده نسبت به جنس ماده از لحاظ اقتصادی دارای ارزش بیشتری است و با قیمت افزون تری نسبت به جنس ماده به فروش می‌رسد (۱، ۲ و ۳).

گردید. به منظور انجام PCR، نیاز به پرایمرهای اختصاصی تعیین جنسیت می باشد که بر اساس ژن *CHD* قناری طراحی گردند. اما پس از انجام مطالعات بسیار، توالی ژن *CHD* قناری یافت نشد لذا به منظور طراحی پرایمر از توالی ژن *CHD-W* مربوط به پرنده ای *Fringillidae* با نام علمی *Hemispingus frontalis* که از خانواده *Serinus canaria* دارد، می باشد و قرابت فیلوزنوتیکی بالایی با *Serinus canaria* دارد، استفاده شد. توالی پرایمرهای طراحی شده برای این تحقیق به صورت زیر است:

Canary-F: 5'- GGATGAGGAACGTGCAAAAC -3'
Canary-R: 5'- AATAGTCGCGGTCTTCCAC -3'

برای انجام واکنش PCR حجم نهایی واکنش ۲۵ میکرولیتر بوده که شامل: ۲۰ نانوگرم DNA الگو، ۲ میلی مولار $MgCl_2$ ، ۲۵ پیکومول از هر پرایمر، ۱ واحد آنزیم DNA پلیمراز Taq و ۲۰۰ میکرو مولار dNTP Mix بود. برای انجام واکنش PCR از دستگاه مسترسایکلر گریدینت شرکت Eppendorf استفاده شد. برنامه ی حرارتی مورد استفاده شامل: ۹۵ درجه سانتی گراد ۵ دقیقه، سپس ۳۰ چرخه دمایی به ترتیب ۹۴ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه، ۵۸ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه و ۷۲ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه و یک مرحله نهایی ۷۲ درجه سانتی گراد ۵ دقیقه تنظیم گردید. سپس محصولات PCR با ژل آگاراز ۱/۵ درصد الکتروفورز گردید و توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شد و با استفاده از نور UV مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

از کالاموس پر پرنده ای مورد آزمایش، DNA ی ژنومی با موفقیت استخراج گردید و کیفیت DNA ای استخراج شده با استفاده از روش طیف سنجی و الکتروفورز روی ژل آگاراز ۱ درصد تعیین گردید. سپس غلظت DNA استخراج شده به میزان $20\text{ ng}/\mu\text{l}$ تنظیم شد. انجام PCR با پرایمرهای اختصاصی طراحی شده ی تعیین جنسیت در قناری و مشاهده ی نتایج حاصل بر روی ژل آگاراز ۱/۵ درصد نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های ۳۴۵ و ۳۰۶ جفت باز برای جنس ماده و یک باند ۳۰۶ جفت باز برای جنس نر بود که در شکل ۱ مشاهده می شود.

یکی از بهترین راه ها برای تعیین رن و ماده استفاده از روش های مولکولی بر اساس DNA است. یافتن یک نشانگر مولکولی مناسب برای تعیین جنسیت، کاری دشوار است. از آنجا که ژنوتیپ پرنده ماده ZW و ژنوتیپ پرنده نر ZZ می باشد، لذا کروموزوم W فقط در جنس ماده پرنده ای وجود دارد و بر اساس آن می توان مارکر ژنتیکی مناسبی برای تفکیک جنس های نر و ماده از هم یافت. این ویژگی همانند کروموزوم Y در انسان است با این تفاوت که در انسان و سایر پستانداران، جنس نر هتروگامتیک است و جنس ماده هموگامتیک می باشد ولی در پرنده ای کروموزوم W بسیار حفظ شده بوده و با استفاده موجود بر روی کروموزوم W از این گونه ژن ها می توان در تمام گونه های پرنده ای، جنسیت پرنده را با استفاده از یک جفت پرایمر و طی یک مرحله انجام واکنش PCR تعیین کرد (۶). در برخی از پرنده ای، نظری پرنده ای عظیم الجثه مانند شترمنغ، پرایمرهای مربوط به ژن *CHD*، سبب تکثیر قطعاتی در هر دو ژن *W* و *Z* می گردد زیرا این پرایمرهای هم زمان با هم قسمت های هومولگ از ژن *CHD-W* و ژن *CHD-Z* را تکثیر می نمایند اما در این قطعات تکثیر شده، تفاوت طول مشاهده می گردد و از همین خاصیت می توان به منظور تعیین جنسیت پرنده ای بهره گرفت (۷-۸). هدف از این تحقیق تنظیم روش PCR برای تعیین جنسیت قناری برای اولین بار با پرایمرهای جدید طراحی شده می باشد.

مواد و روش ها

به منظور تعیین جنسیت قناری جمعا از ۲۹ قطعه قناری نمونه گیری به عمل آمد. نمونه گیری از انتهای کالاموس پر قناری های زنده (۱۱ ماده و ۶ نر و ۱۲ جوجه قناری با جنسیت نامعلوم) صورت گرفت و DNA ی ژنومی با استفاده از روش استاندارد فل-کلروفرم استخراج گردید و جهت اطمینان از کیفیت DNA مشاهده قطعات DNA ای استخراج شده از ژل آگاراز ۱ درصد و رنگ آمیزی توسط اتیدیوم برماید استفاده شد، همچنین کیفیت DNA استخراج شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر نیز بررسی



شکل ۱- واکنش PCR برای تعیین جنسیت قناری.

شماره های ۱ تا ۳ مربوط به قناری های ماده بوده که دو قطعه DNA به طول های ۳۴۵ و ۳۰۶ جفت باز تکثیر گردیده

و شماره های ۴ و ۵ که فقط یک باند به طول ۳۰۶ جفت باز دارند، نشان دهنده جنسیت نر در این پرنده می باشد.

شماره ۶ مارکر 100bp ساخت شرکت Fermentas می باشد.

همکاران برای تعیین جنسیت زن Zebra Finches از ژن *CHD1-Z* و ژن *CHD1-W* استفاده کردند (۱۲). در این تحقیق با توجه به اینکه توالی ژنهای *CHD1-W* و *CHD1-Z* مربوط به قناری در بانک ژن جهانی ثبت نگردیده اند، لذا همان طور که در بالا اشاره شد، از روی توالی ژن *CHD1-W* مربوط به پرنده ای شبیه به قناری، ترتیب نوكلئوتیدی پرایمرهای انتخاب و نتایج مطلوبی در مورد تعیین جنسیت قناری بدست آمد. این سیستم تعیین جنسیت مولکولی بر اساس PCR که برای قناری ماده دو قطعه DNA و برای قناری نر، یک قطعه DNA تکثیر می نماید برای اولین بار تنظیم و معرفی می گردد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و همچنین کلیه همکاران مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه تقدير و تشکر به عمل می آید.

نتایج حاصل نشان می دهد، تعیین جنسیت قناری با استفاده از این روش، بسیار سریع، دقیق و کم هزینه بوده و در هر دوره از زندگی این پرنده می تواند بکار رود. از آنجایی که تعیین جنسیت پرنده‌گان با استفاده از روش‌های قدیمی مانند لمس کلوک، سنجش میزان استروئید، کاربوتاپینگ... دشوار و زمانبر می باشد و حتی در برخی موارد موجب مرگ پرنده می شود (۹) لذا محققین متعددی تا کنون در راستای تعیین جنسیت مولکولی موجودات تلاش نموده اند و برخی نیز به نتایج مطلوبی دست یافته اند. برای مثال در سال ۱۹۹۸ Griffiths و همکاران با استفاده از دو ژن *CHD1-Z* و *CHD1-W* و طراحی پرایمر های متعدد، به تعیین جنسیت گروهی از پرنده‌گان (شتر مرغ، قو، کبوتر، غاز وحشی و ...) پرداخته اند (۱۰). در سال ۲۰۰۰ Nesje و همکاران سعی کردند با استفاده از دو جایگاه میکروستلاتیتی، پرنده‌گانی از قبیل شاهین، باز وحشی، قوش و غیره را تعیین جنسیت نمایند اما این روش در تعیین جنسیت برخی از پرنده‌گان مورد آزمایش موفقیت آمیز نبود (۱۱). همچنین در سال ۲۰۰۴ Agate و

منابع

- 6- Griffiths R and Tiwari B (1996) Avian *CHD* genes and their use in methods in sex identification of birds. International patent publication, WO9639505.
- 7- Griffiths R and Korn R (1997) A *CHD1* gene is Z chromosome linked in the chicken *Gallus domesticus*. *Gene*, 197: 225-229.
- 8- Bermúdez-Humarán LG, García-García A, Leal-Garza CH, Riojas-Váldez V, Jaramillo-Rangel G and Montes-de-Oca-Luna R (2002) Molecular sexing of monomorphic endangered Ara birds. *Journal of Experimental Zoology*, 292: 677-680.
- 9- Cerit H and AvanusK (2007) Sex identification in avian species using DNA typing methods. *World's Poultry Science Association*, 63: 91-99.
- 10- Griffiths R, Double MC, Orr K and Dawson RJG (1998) A DNA test to sex most birds. *Molecular Ecology*, 7: 1071-1075.
- 11- Nesje M and Roed K (2000) Sex identification in falcons using microsatellite DNA markers. *Hereditas*, 132: 261-263.
- 12- Agate RJ, Choe M and Arnold AP (2004) Sex Differences in Structure and Expression of the Sex Chromosome Genes *CHD1Z* and *CHDIW* in Zebra Finches. *Molecular Biology and Evolution*, 21(2): 384-396.
- 1- فرشچی ع. (۱۳۶۲). قناری: نگهداری، تغذیه، بیماری‌ها، تکثیر و پرورش، آوازخوانی و شناخت حالات، اتوفون فریش (مؤلف). چاپ نهم. تهران: موسسه انتشاراتی روزبهان، ۷-۴۵؛ ۱۳۶۲
- 2- Takagi N, Itoh M and Sasaki M (1972) Chromosome studies in four species of ratitae (Aves). *Chromosoma*, 36: 281-291.
- 3-Jensen T, Pernasetti FM and Durrant B (2003) Conditions for rapid sex determination in 47 avian species by PCR of genomic DNA from blood, shell-membrane blood vessels and feathers. *Zoo Biology*, 22: 561-567.
- 4- Stefos K and Arrighi FE. (1971) Heterochromatic nature of W chromosomes in birds *Experimental Cell Research*, 68: 228-231.
- 5- Gubbay J, Collignon J, Koopman P, Capel B, Economou A, Munsterberg A, Vivian N, Goodfellow P and Lovell-Badge R (1990) A gene mapping to the sex-determining region of the mouse Y chromosome is a member of a novel family of embryonically expressed genes. *Nature*, 346, 245-250.