

## شناسایی آلل‌های خود ناسازگاری در ژنوتیپ‌های آلو (تجاری و بومی) با استفاده از تکثیر آلل‌ها به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمرز

مرضیه اتحادپور<sup>۱</sup>، محمدرضا فتاحی مقدم<sup>۲\*</sup>، ذبیح اله‌زمانی<sup>۳</sup>

۱، ۲ و ۳- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیاران گروه علوم باغبانی، پردیس

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

\* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: fattahi@ut.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۸۹/۱۰/۱۳ - تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۸)

### چکیده

در این بررسی، ژنوتیپ‌های S-RNase مربوط به ۳۴ ژنوتیپ آلو (*P.domestica*) از مناطق مختلف کشور به همراه ۵ رقم تجاری و نمونه میروبالان (جمعاً ۴۰ ژنوتیپ) بوسیله تکثیر آلل‌های S با جفت آغازگرهای دژنره و به روش PCR بر اساس ناحیه حفاظت‌شده ژن S-RNase جنس پرونوس مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از جفت آغازگرهای دژنره EM PC2consFD/ EM PC3consRD تعداد ۲۳ باند در محدوده ۱۸۳۰-۳۲۰ جفت باز مشاهده شد که ۱۴ باند مربوط به آلل‌های گزارش شده قبلی و ۹ باند جدید بود. در ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ۲۳ ژنوتیپ دو باند نشان دادند که هتروزیگوسیتی در این مکان را نشان می‌دهد و بقیه ژنوتیپ‌ها فقط یک باند نشان دادند. بر اساس نتایج بدست آمده آلل‌های S<sub>c</sub>، باند ۶۲۱ bp و S<sub>i</sub> به ترتیب با ۳۰، ۱۷/۵ و ۱۲/۵ درصد بیشترین فراوانی را در ژنوتیپ آلوهای ایرانی داشتند که آلل S<sub>c</sub> بیشترین فراوانی (۱۷/۱ درصد) را در جمعیت ویلان کرج نشان داد. ژنوتیپ S سانتاروزا در این بررسی S<sub>i</sub>S<sub>c</sub> تشخیص داده شد که با گزارش‌های قبلی (S<sub>c</sub>S<sub>c</sub>) متفاوت است. همچنین ژنوتیپ S شایرو در این آزمایش دو آلل نشان داد (S<sub>i</sub>S<sub>i</sub>) در صورتی که قبلاً یک باند (S<sub>i</sub>) گزارش شده بود. اختلاف ژنوتیپ‌های S مشاهده شده و گزارش شده در ارقام شایرو و سانتاروزا ممکن است به دلیل موتاسیون در مکان S باشد و یا اینکه ژنوتیپ ارقام موجود در این بررسی با ژنوتیپ ارقام گزارش شده متفاوت باشد. جفت آغازگر دژنره PaConsI-F/ EM PC5consRD تعداد ۱۴ باند در محدوده ۲۴۹۵-۸۷۵ جفت باز در ژنوتیپ‌های مورد بررسی ایجاد کرد. با استفاده از این جفت آغازگر در ۲۵ نمونه از ژنوتیپ‌های مورد بررسی دو باند نشان دادند و بقیه آن‌ها یک باند نشان دادند. همچنین یک ژنوتیپ هیچ‌گونه بانندی با استفاده از هر دو جفت آغازگر نشان نداد. نتایج این بررسی نشان داد که PCR می‌تواند یک روش سریع و مؤثر برای تعیین ژنوتیپ‌های خودناسازگاری در آلو می‌باشد.

### مقدمه

آلو از جمله گونه‌های مهم جنس پرونوس است که جایگاه ویژه‌ای در صنعت میوه‌کاری دارد. مقدار تولید جهانی آلو و گوجه در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰۷۷۶۲۳۲ تن و سطح زیر کشت آن حدود ۲۵۳۴۸۷۳ هکتار بوده است.

### واژه‌های کلیدی

آلل‌های S-RNase،  
خودناسازگاری گامتوفیتیک،  
ژنوتیپ‌های بومی آلو.

کلاسیک با گرده‌افشانی‌های کنترل شده و مشاهده رشد لوله گرده با میکروسکوپ انجام می‌شود (Imani 1383). به علاوه، روش‌های مولکولی DNA مانند شناسایی آلل‌های مربوط به ناسازگاری گلیکوپروتئین‌های خامه (SRNase) نیز استفاده می‌شود (Ishimizu et al. 1999) و روش‌های بیوشیمیایی مانند تجزیه گلیکوپروتئین‌های خامه (SRNase) نیز استفاده می‌شود (Murfett et al. 1992). آلل‌های S و گروه‌های ناسازگاری تعدادی از درختان میوه مانند گیلاس (Wang et al. 2010)، بادام (Halasz et al. 2008) و (عبادی و همکاران، ۱۳۹۰)، سیب (Kitahara et al. 2005)، گلابی آسیایی (Sanzol and Herrero, 2002)، زردآلو (Feng et al. 2006) با استفاده از روش‌های مولکولی گزارش شده است. آلوهای دیپلوئید (آلوهای ژاپنی و میروبالان) خودناسازگار هستند و خودسازگاری به صورت یک پدیده استثنایی در آن‌ها دیده می‌شود که به دلیل دارا بودن آلل  $S_e$  (آلل خودسازگار) می‌باشد (Szabo 2003). وضعیت سازگاری در آلوهای اروپایی از حالت خودناسازگاری کامل تا خودسازگاری کامل متغیر است (Hegedus and Halasz 2006). درصد تشکیل میوه متغیر در آن‌ها ممکن است ناشی از دانه‌های گرده با چندین آلل و یا شرایط متفاوت محیطی در سال‌های مختلف باشد. در دانه گرده با چند آلل، آلل‌های S ممکن است به صورت رقابتی عمل کنند به طوری که دانه گرده‌ای که در خامه رشد می‌کند دارای آلل S مشابه با والد مادری باشد. (Tobutt et al. 2004). در آلودی ژاپنی S-RNase یک گلیکوپروتئین با وزن ملکولی حدود ۳۰ کیلو دالتون می‌باشد که حاوی دو مکان فعال برای RNase نوع  $T_2/S$ ، پنج منطقه محافظت شده و یک مکان با تنوع خیلی بالا می‌باشد که منحصراً در مادگی بیان می‌شود. اولین ژنوتیپ S ( $S_a S_b$ ) در آلودی ژاپنی رقم 'Sordum' توسط Yamane گزارش شد. سپس Beppu تنوع آلل‌های S را در آلوهای ژاپنی با استفاده از آغازگرهای طراحی شده از توالی‌های حفاظت شده S-RNase رزاسه گزارش کردند. آن‌ها ۱۴ آلل S متفاوت ( $S_a-S_n$ ) شناسایی کردند و دریافتند که ژن *S-RNase* آلودی ژاپنی همانند دیگر گونه‌های جنس پرونوس دارای دو اینترون می‌باشد. تاکنون ۲۷ آلل S توسط Sapir, Beppu, Zhang و Guerrra در آلودی ژاپنی گزارش شده است. موتاسیون در سیستم خودناسازگاری گامتوفیتیک ممکن است باعث ایجاد خودسازگاری شود (Tao et al. 2007)

(FAO 2009). آلوها به طور جداگانه در سه منطقه اروپا، آسیا و آمریکای شمالی اهلی شده‌اند. پایه کروموزومی تمام آلوها  $x=8$  است که ژنوم دیپلوئید تا هگزاپلوئید داشته و از چین تا اروپا گسترش دارند. یکی از عوامل بسیار مهم در گرده‌افشانی و تشکیل میوه وضعیت سازگاری است. خودناسازگاری یک مکانیسم ژنتیکی می‌باشد که گیاهان گلدار برای افزایش دگرگشتی و جلوگیری از پس روی ژنتیکی به کار گرفته‌اند. بسیاری از آلوها خودناسازگار هستند و تولید میوه از طریق خودگشتی در آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین آلوها همانند دیگر گونه‌های هسته-دار قادر به تولید میوه به صورت پارتنوکارپ نیستند و به دلیل این که باروری کافی برای تشکیل میوه اهمیت دارد لذا ژنوتیپ خودناسازگاری آن‌ها مورد مطالعه گسترده قرار گرفته است. شناسایی آلل‌های خودناسازگاری جهت انتخاب صحیح درختان گرده‌زا و افزایش عملکرد در باغ‌های تجاری و همچنین در برنامه‌های اصلاحی به منظور اطمینان از موفقیت در تلاقی‌های کنترل شده حائز اهمیت می‌باشد (Lopez et al. 2006). خودناسازگاری به طور گسترده‌ای در خانواده‌های گیاهی سیب‌زمینی، رز و میمون در سطح ملکولی مطالعه شده است که در تمام آن‌ها به صورت گامتوفیتیک کنترل می‌شود. خودناسازگاری گامتوفیتیک در خانواده رزاسه توسط دو ژن به نام‌های *S-RNase* و *SFB* که در مکان ژنی S واقع هستند کنترل می‌شود. فاصله بسیار نزدیک این دو ژن روی DNA کروموزومی باعث می‌شود که احتمال کراسینگ اور بسیار کاهش یابد بنابراین هر دو ژن با هم به توارث می‌رسند (Kao and Tsukamoto 2004). ژن *S-RNase* در خانواده‌های سیب‌زمینی، رز و میمون یک گلیکوپروتئین درون مادگی بیان می‌کند که توالی آن در خانواده رزاسه تنوع بالایی نشان داده است. ژن *S-RNase* تمام هسته دارها دارای دو اینترون می‌باشد که در آلل‌های مختلف اندازه‌های متفاوتی دارند. اینترون اول که از نظر اندازه کوچکتر است بین توالی پپتید راهنما و اولین ناحیه محافظت شده قرار دارد و اینترون دوم با فاصله بیشتر درون ناحیه با تنوع بالا است. همچنین ۵ ناحیه محافظت شده با نام‌های C5، C1، C2، C3، C4 در توالی آمینو اسیدهای آن‌ها قابل شناسایی است (Ushijima et al. 1998). روابط سازگاری بین ژنوتیپ‌ها و شناسایی گروه‌های ناسازگاری آن‌ها در درختان میوه به صورت

که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده است به همراه ۵ رقم تجاری شامل: سانتاروزا، شاپرون، مجار، شاپرو، قطره طلا، و نمونه میروبالان بودند (جدول ۱).

استخراج DNA از نمونه‌های برگگی و با استفاده از روش Murray and Thompson (۱۹۸۰) با اندکی تغییرات بود که شامل افزودن PVP (۲۰ گرم در لیتر) به بافر استخراج و افزایش زمان قرار دادن نمونه‌ها در آب گرم ۶۵ درجه از ۳۰ دقیقه به یک ساعت بود. برای تکثیر عمومی آلل‌های S از جفت آغازگر دژنره اینترون دوم شامل آغازگر پیش‌رو EM PC2consRD و پس‌رو (معکوس) EM PC3consRD طراحی شده توسط ساترلند و جفت آغازگر دژنره جفت اینترون شامل آغازگر پیش‌رو PaConsI-F (Sonneveld et al. 2003) با آغازگر پس‌رو (معکوس) EM PC5consRD (Sutherland et al. 2004) استفاده گردید.

در آزمایش‌های مربوط به خود و یا دگر کرده‌افشانی که بین وارپته‌های دارای ژنوتیپ  $S_e S_e$  توسط Beppu انجام شد نتایج بر اساس توارث ژنوتیپ S به دو گروه  $S_e S_e$  و  $S_e S_e$  تقسیم شدند که نشان می‌داد فقط آلل  $S_e$  از والد پدری به ارث می‌رسد. این نتایج آلل  $S_e$  را به‌عنوان آلل خودسازگاری تایید می‌کند. هدف این بررسی شناسایی آلل‌های ناسازگاری در ژنوتیپ‌های آلو موجود در ایران و چند ژنوتیپ تجاری با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمرز بوده است. شناسایی آلل‌های S-RNase ژنوتیپ‌های آلو و تعیین خود و دگرناسازگاری آن‌ها می‌تواند در انتخاب والدین در برنامه‌های اصلاحی و در انتخاب ارقام مناسب در باغ‌های تجاری مفید واقع شود.

### مواد و روش‌ها

مواد گیاهی در این تحقیق شامل ۳۴ ژنوتیپ آلو موجود در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران در کرج بود

جدول ۱- اسامی ژنوتیپ‌های آلو مورد بررسی

شماره	ژنوتیپ	شماره	ژنوتیپ	شماره	ژنوتیپ	شماره	ژنوتیپ
۱	جواهرده ۱	۱۱	4M-47	۲۱	برجی نیشابور ۲	۳۱	86-n-4
۲	جواهرده ۲	۱۲	86-4mm-15	۲۲	آلو وحشی	۳۲	18-3
۳	جواهرده ۳	۱۳	ولیان ۱	۲۳	آلو شیرین هسته جدا (چناران)	۳۳	86-b3-4
۴	جواهرده ۴	۱۴	ولیان ۲	۲۴	اسجیل (چناران)	۳۴	درگری
۵	4M-63	۱۵	ولیان ۳a	۲۵	آلوچه کلات نادر ۲	۳۵	سانتاروزا
۶	4M-25	۱۶	ولیان ۳b	۲۶	آلوچه کلات نادر ۴	۳۶	شاپرون
۷	4M-91	۱۷	ولیان ۴	۲۷	بی نام ۱	۳۷	مجار
۸	4M-69	۱۸	ولیان ۵	۲۸	۸۶-۵۱-۳	۳۸	شاپرو
۹	4M-44	۱۹	ولیان ۶	۲۹	بی نام ۲	۳۹	قطره طلا
۱۰	4M-12	۲۰	برجی نیشابور ۱	۳۰	n-1	۴۰	پایه

کدها بیانگر ژنوتیپ‌های مخلوط از نواحی مختلف جمع آوری هستند


جدول ۲- جفت آغازگرهای دژنره مورد استفاده در روش PCR جهت تکثیر آلل‌های S در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه آلو

نام آغازگر	کد آغازگر	نوع آغازگر	(5' ← 3') توالی آغازگر
EM PC2consFD	C2	پیش‌رو	TCA C(A/C)A T(C/T)C ATG GCC TAT
EM PC3consRD	C3	معکوس	A(A/T)(C/G) T(A/G)C C(A/G)T G(C/T)T TTG TCC ATT C
PaConsI-F	SP	پیش‌رو	(C/A)CT TGT TCT TG(C/G) TTT (T/C)GC TTT CTT C
EM PC5consRD	C5	معکوس	CAA AAT ACC ACT TCA TGT AAC A(A/G)



مشاهده شده و گزارش شده در ارقام شایرو و سانتاروزا ممکن است به دلیل موتاسیون باشد و یا اینکه ژنوتیپ ارقام موجود در ایستگاه تحقیقات با ژنوتیپ ارقام گزارش شده متفاوت باشد. در آزمایشی که توسط Guerra et al. (2009) برای شناسایی آلل‌های S در آلودی ژاپنی انجام شد ژنوتیپ‌های S متفاوتی برای رقم‌های 'Kelsey' ( $S_h S_k$ )، 'Green Sun' ( $S_b S_c$ ) و 'Friar' ( $S_b S_h$ ) گزارش شد که مطالعات قبلی به ترتیب با ژنوتیپ‌های S ( $S_f S_h$ )، ( $S_c S_h$ ) و ( $S_h S_k$ ) گزارش شده بودند. هر دو ژنوتیپ گزارش شده برای 'Kelsey' متناسب با توارث S-allele از والدین آن بوده است. ارقام سانتاروزا و شابرون موجود در ایستگاه تحقیقات ژنوتیپ S یکسانی نشان دادند ( $S_b S_c$ ) بنابراین در یک گروه دگر ناسازگاری قرار می‌گیرند و گرده‌دهنده مناسبی برای یکدیگر نخواهند بود و برای تولید میوه کافی حتماً به ژنوتیپ‌های دیگری با آلل‌های S متفاوت نیاز دارند. ژنوتیپ S رقم شابرون تا کنون گزارش نشده است. ژنوتیپ‌هایی که دارای یک آلل S مشترک هستند سازگاری نسبی با یکدیگر داشته و پتانسیل پایینی به عنوان گرده‌دهنده برای یکدیگر دارند. در این پژوهش آلل خودباروری ( $S_e$ ) در ژنوتیپ‌های ویان ۴، n-1 و آلودی وحشی شناسایی شد. آلل  $S_e$  به‌عنوان آلل خودسازگاری در آلو شناخته شده است که معادل  $S_5$  است. Halasz طول باند ۱۴۵۰ bp را با استفاده از جفت آغازگر EM PC2consFD/ EM PC3consRD برای  $S_e$  در نظر گرفت. آلل مشابهی در ژنوتیپ‌های 'Santa Rosa' و 'Sweet utumn' شناسایی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از روش PCR آلل  $S_e$  باند ۶۲۱ و آلل  $S_i$  به ترتیب با ۳۰، ۱۷/۵ و ۱۲/۵ درصد بیشترین فراوانی را در ژنوتیپ‌های آلودی ایرانی داشتند که آلل  $S_e$  بیشترین فراوانی (۱۷/۱ درصد) را در جمعیت ویان کرج نشان داد همچنین یکی از آلل‌های شابرون و سانتاروزا نیز آلل  $S_e$  بود. Sapir فراوانی آلل  $S_e$  را در ۴۳ ژنوتیپ آلودی ژاپنی ۱۶/۸ درصد بدست آوردند. آلل‌های  $S_e$ ،  $S_h$ ،  $S_i$ ،  $S_{19}$ ،  $S_{22}$ ،  $S_{23}$  و باندهای ۶۶۵ و ۳۹۵ کمترین فراوانی (۲/۵ درصد) را نشان دادند (شکل ۲). ارقام سانتاروزا و شابرون موجود در ایستگاه تحقیقات ژنوتیپ S یکسانی نشان دادند ( $S_b S_c$ ) بنابراین در یک گروه دگر ناسازگاری قرار می‌گیرند و گرده‌دهنده مناسبی برای یکدیگر نخواهند بود و برای تولید میوه کافی حتماً به ژنوتیپ‌های

ژاپنی بدست آوردند. Guerra گروه‌های ناسازگاری ۶۸ ژنوتیپ آلودی ژاپنی را بوسیله تکثیر ژن S-RNase به‌روش PCR مشخص کردند که ۱۲ گروه ناسازگاری جدید توصیف شد. ژنوتیپ S مربوط به ۵۰ رقم برای اولین بار گزارش شد و ۵ آلل جدید-S-RNase (So- Sp- Sq- Sr- Ss) نیز شناسایی شد.



شکل ۱- تکثیر آلل‌های خودناسازگاری در آلو با استفاده از از جفت آغازگر EM PC2consFD/PC3consRD با روش PCR. نمونه‌ها از چپ به راست: جواهرده ۱، 86-n-4، ویان ۵، اسجیل (چناران)، 86-4mm-15، مجار، آلودی وحشی، 4M-47، n-1، کلات نادر ۴، 4M-44، برجی نیشابور ۱، ویان ۳a، ویان ۲، 4M-69، جواهر ده ۳، قطره طلا، آلودی شیرین هسته جدا (چناران)، 4M-12، شایرو، بی نام ۱، آلوچه کلات نادر ۲، ویان ۳b، ۵۱-۳، ۸۶-۵۱، شابرون، بی نام ۲، جواهر ده ۲، 4M-91، ویان ۶، سانتاروزا، برجی نیشابور ۲، ویان ۴، 86-b3-4، 18-3، 4M-25، 4M-63، ویان ۱، جواهر ده ۴، میکروبالان، درگزی

در ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ۲۳ ژنوتیپ دو باند نشان دادند که نشان‌دهنده هتروزیگوت بودن مکان S آن‌ها می‌باشد در حالی‌که ژنوتیپ‌های جواهرده ۱، 86-n-4، ویان ۵، اسجیل (چناران)، آلودی وحشی، ویان ۲، 4M-12، ویان ۳، جواهر ده ۲، ویان ۶، ویان ۴، 4M-63، 86-b3-4، ویان ۱، میکروبالان فقط یک باند نشان دادند که ممکن است به دلیل هموزیگوت بودن در مکان S باشد (جدول ۵) و یا آلل دوم در این رقم‌ها ممکن است با استفاده از این جفت آغازگر قابل شناسایی نباشد. عدم امکان شناسایی تمام آلل‌های خودناسازگاری با استفاده از جفت آغازگرهای عمومی به‌روش PCR در بادام توسط Sanchez et al. (2004) اعلام شده است. همچنین Halasz (2007) گزارش کرد که تکثیر یک باند در رقم شایرو ( $S_f$ ) ممکن است به دلیل آلل‌های با اندازه ایترون مشابه باشد در حالی‌که رقم شایرو در این آزمایش دو آلل ( $S_h S_i$ ) نشان داد. ژنوتیپ S سانتاروزا در این بررسی ( $S_b S_c$ ) بدست آمد که با نتایج گزارش شده توسط Guerra متفاوت بود. آن‌ها ژنوتیپ  $S_e S_e$  را برای سانتاروزا گزارش کردند. اختلاف ژنوتیپ‌های S

به ترتیب با ۳۰، ۱۷/۵ و ۱۲/۵ درصد بیشترین فراوانی را در ژنوتیپ‌های آلو ایرانی داشتند که آلل  $S_e$  بیشترین فراوانی (۱۷/۱ درصد) را در جمعیت ویان کرج نشان داد همچنین یکی از آلل‌های شابرون و ساتروزا نیز آلل  $S_c$  بود. Sapir و همکاران (۲۰۰۸) فراوانی آلل  $S_c$  را در ۴۳ ژنوتیپ آلو ژاپنی ۱۶/۸ درصد بدست آوردند. آلل‌های  $S_e, S_h, S_i, S_k, S_m, S_{23}, S_{22}, S_{19}$  و باندهای ۶۶۵ و ۳۹۵ کم‌ترین فراوانی (۲/۵ درصد) را نشان دادند (شکل ۲). با استفاده از جفت آغازگر EM PC3consRD/ EM PC2consFD برای  $S_e$  در نظر گرفت. آلل مشابهی در ژنوتیپ‌های 'Santa Rosa' و 'Sweet utumn' شناسایی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از روش PCR آلل  $S_c$ ، باند ۶۲۱ و آلل  $S_i$

دیگری با آلل‌های S متفاوت نیاز دارند. ژنوتیپ S رقم شابرون تا کنون گزارش نشده است. ژنوتیپ‌هایی که دارای یک آلل S مشترک هستند سازگاری نسبی با یکدیگر داشته و پتانسیل پایینی به عنوان گرده‌دهنده برای یکدیگر دارند. در این پژوهش آلل خودباروری ( $S_e$ ) در ژنوتیپ‌های ویان  $E, n-1$  و آلو وحشی شناسایی شد. آلل  $S_e$  به‌عنوان آلل خودسازگاری در آلو شناخته شده است که معادل  $S_5$  است. Halasz طول باند ۱۴۵۰ bp را با استفاده از جفت آغازگر EM PC3consRD/ EM PC2consFD برای  $S_e$  در نظر گرفت. آلل مشابهی در ژنوتیپ‌های 'Santa Rosa' و 'Sweet utumn' شناسایی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از روش PCR آلل  $S_c$ ، باند ۶۲۱ و آلل  $S_i$


جدول ۴- اندازه باندهای مشاهده شده، اندازه نزدیک‌ترین آلل در NCBI و تفاوت آلل‌های مشاهده شده با آلل‌های متناظر در NCBI

اندازه باندهای مشاهده شده (bp)	نزدیک‌ترین آلل در NCBI (bp)	نام آلل	تفاوت آلل‌های S آلو موجود در NCBI با آلل‌های مشاهده شده متناظر (bp)
1574	1565	$S_b$	9
1430	1458	$S_e$	-28
1317	1317	$S_d$	0
1181	1188	$S_e$	-7
923	907	$S_i$	16
768	772	$S_{23}$	-4
731	712	$S_{19}$	19
692	681	$S_{24}$	11
596	579	$S_{22}$	17
534	532	$S_h$	2
505	495	$S_{25}$	10
412	430	$S_i$	-18
364	372	$S_k$	-8
326	331	$S_m$	-5
* اندازه باندهای جدید مشاهده شده			
1830	-	$S_j$	-
1214	-	$S_{II}$	-
988	-	$S_{III}$	-
794	-	$S_{IV}$	-
665	-	$S_V$	-
621	-	$S_{VI}$	-
459	-	$S_{VII}$	-
395	-	$S_{VIII}$	-
340	-	$S_{IX}$	-

\* نام باندهای جدید با حروف یونانی مشخص شده است.

جدول ۵- طول باند S در ژنوتیپهای مورد مطالعه با استفاده از دو جفت آغازگرهای PaConsI-F/ EM PC5consRD و EM PC2consFD/ EM PC3consRD

شماره	رقم	ژنوتیپ S	اندازه آلل مشاهده شده	شماره	رقم	ژنوتیپ S	اندازه آلل مشاهده شده
۱	جواهرده ۱	S <sub>c</sub>	۱۶۶۰, ۱۹۰۵	۲۱	برجی نیشابور ۲	S <sub>VIII</sub>	۱۰۷۰, ۱۶۶۰
۲	جواهرده ۲	S <sub>c</sub>	۱۰۲۰, ۱۶۶۰	۲۲	آلوی وحشی	S <sub>I</sub> S <sub>c</sub>	۱۶۶۰, ۲۴۹۵
۳	جواهرده ۳	S <sub>d</sub> S <sub>m</sub>	۱۶۶۰	۲۳	آلوی شیرین هسته جدا (چناران)	S <sub>IV</sub> S <sub>25</sub>	۱۱۷۰, ۱۳۹۰, ۱۵۲۰, ۲۲۸۰
۴	جواهرده ۴	S <sub>IV</sub> S <sub>25</sub>	۱۱۷۰, ۱۶۶۰	۲۴	اسجیل (چناران)	S <sub>VII</sub>	۱۰۷۰
۵	4M-63	S <sub>d</sub>	۱۶۶۰, ۲۱۴۱	۲۵	آلوچه کلات نادر ۲	S <sub>I</sub> S <sub>VI</sub>	۱۸۰۰ و ۲۴۹۵
۶	4M-25	S <sub>24</sub> S <sub>I</sub>	۱۵۲۰, ۲۴۹۵	۲۶	آلوچه کلات نادر ۴	S <sub>c</sub> S <sub>VI</sub>	۱۳۹۰, ۱۹۰۵
۷	4M-91	S <sub>d</sub> S <sub>m</sub>	۹۴۰, ۲۱۴۱	۲۷	بی نام ۱	S <sub>VI</sub> S <sub>m</sub>	۸۷۵
۸	4M-69	S <sub>I</sub> S <sub>d</sub>	۲۰۵۳ و ۲۴۹۵	۲۸	۸۶-۵۱-۳	S <sub>VI</sub> S <sub>V</sub>	۱۰۲۰, ۱۲۵۰
۹	4M-44	S <sub>c</sub> S <sub>III</sub>	۱۶۶۰, ۱۹۰۵	۲۹	بی نام ۲	S <sub>23</sub> S <sub>I</sub>	۱۵۲۰
۱۰	4M-12	S <sub>c</sub>	۱۹۰۵	۳۰	n-1	S <sub>c</sub> S <sub>I</sub>	۲۱۴۱, ۲۴۹۵
۱۱	4M-47	S <sub>c</sub> S <sub>III</sub>	۱۲۵۰, ۱۹۰۵	۳۱	86-n-4	S <sub>VI</sub>	۱۶۶۰, ۲۱۴۱
۱۲	86-4mm-15	S <sub>22</sub> S <sub>24</sub>	۱۳۹۰, ۱۶۶۰	۳۲	18-3	S <sub>VI</sub> S <sub>c</sub>	۱۹۰۵
۱۳	ولیان ۱	S <sub>IX</sub>	۱۰۲۰, ۱۶۶۰	۳۳	86-b3-4	S <sub>I</sub>	۱۱۷۰
۱۴	ولیان ۲	S <sub>c</sub>	۱۰۲۰, ۲۰۵۳	۳۴	درگزی	S <sub>k</sub> S <sub>24</sub>	-
۱۵	ولیان ۳a	S <sub>c</sub> S <sub>I</sub>	۱۰۲۰, ۱۶۶۰	۳۵	سانتاروزا	S <sub>c</sub> S <sub>b</sub>	۱۹۰۵, ۲۲۸۰
۱۶	ولیان ۳b	S <sub>IX</sub>	۸۷۵, ۹۴۰	۳۶	شاپرون	S <sub>c</sub> S <sub>b</sub>	۱۹۰۵, ۲۲۸۰
۱۷	ولیان ۴	S <sub>c</sub>	۲۱۴۱	۳۷	مجار	S <sub>I9</sub> S <sub>24</sub>	۱۳۹۰, ۱۵۲۰
۱۸	ولیان ۵	S <sub>k</sub>	۱۰۲۰, ۹۴۰	۳۸	شایرو	S <sub>II</sub> S <sub>I</sub>	۱۰۷۰, ۱۲۵۰
۱۹	ولیان ۶	S <sub>c</sub>	۱۹۰۵	۳۹	قطره طلا	S <sub>II</sub> S <sub>I</sub>	۱۲۵۰, ۱۸۰۰
۲۰	برجی نیشابور ۱	-	-	۴۰	میروبالان	S <sub>k</sub> S <sub>24</sub>	-



شکل ۲- مقایسه فراوانی نسبی آللهای S در ژنوتیپهای مورد بررسی آلو با استفاده از جفت آغازگر EM PC2consFD/EM PC3consRD



شکل ۳- تکثیر آللهای خود ناسازگاری با استفاده از جفت آغازگر PaConsI-F/ EM PC5consRD در آلو با روش PCR. نمونه‌ها از چپ به راست: جواهرده ۱، 86-n-4، ویلیان ۵، اسجیل (چناران)، 86-4mm-15، ویلیان ۳a، ویلیان ۳b، 4M-44، برجی نیشابور ۱، ویلیان ۳a، ویلیان ۳b، 4M-47، n-1، کلات نادر ۲، 4M-69، جواهر ده ۳، قطره طلا، آلوی شیرین هسته جدا (چناران)، 4M-12، شایرو، بی نام ۱، آلوچه کلات نادر ۲، ویلیان ۳b، ۸۶-۵۱-۳، شاپرون، بی نام ۲، جواهر ده ۲، 4M-91، ویلیان ۲، 86-b3-4، 4M-63، 4M-25، 18-3، ویلیان ۱، جواهر ده ۴، میروبالان، درگزی

اینترون دوم است و توالی‌یابی آلل‌های S بر اساس این ناحیه بوده است و فقط برای چند آلل S بر اساس اینترون اول صورت گرفته است. به همین دلیل اطلاعات ثبت شده برای جفت آغازگر مربوط به جفت اینترون در NCBI مشاهده نشد.

#### نتیجه‌گیری کلی

بر اساس نتایج بدست آمده از تکثیر آلل‌های S آلو بوسیله جفت آغازگر مربوط به اینترون دوم هسته‌دارها، ۲۳ باند با اندازه‌های ۱۸۳۰-۳۲۰ مشاهده شد که ۱۴ آلل آن قبلاً شناسایی شده بود و ۹ باند با طول‌های متفاوت بدست آمد. ژنوتیپ S نمونه‌های مورد بررسی تنوع بالایی نشان داد. بعضی از ژنوتیپ‌ها فقط یک باند نشان دادند که برای تکثیر هر دو باند می‌توان از جفت آغازگرهای تخصصی بهره گرفت. تعداد ۱۴ باند با اندازه‌های ۲۴۹۵-۸۷۵ با استفاده از جفت آغازگر مربوط به هر دو اینترون مشاهده گردید. به دلیل عدم وجود توالی‌های مربوط به اینترون اول در NCBI، نوع آلل تکثیر شده با این روش مشخص نگردید.

#### منابع

Imani A (1383) Flowering biology of temperate fruit (seed bookmarks, bookmarks kernel, dried fruits and fruit fine grain) (translations), published by the Senate.  
Ebadi AS, Kamali K, M Moghaddam Fattahi, M Naqvi, as faith, and horizontal H (1390) Genotyping of self almonds from a breeding program and recognition of the S allele and genotype in some varieties of almonds with external of PCR. Journal of plant breeding and seed, f 1-27, Number 1: 67-57.  
Beppu K, Komatsu N, Yamane H, Yaegaki H, Yamaguchi M, Tao R and Kataoka I (2005) Se-haplotype confers self-compatibility in Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl) . Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 80: 760-764.  
Beppu K, Takemoto Y, Yamane H, Yaegaki H, Yamaguchi M, Kataoka I and Tao R (2003) Determination of S-haplotypes of Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl.) cultivars by PCR and cross-pollination tests. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 78: 315-318.  
Beppu K, Yamane H, Yaegaki H, Yamaguchi M, Kataoka I and Tao R (2002) Diversity of S-RNase genes and S-haplotypes in Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl.). Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 77: 658-664.  
Feng J, Chen X, Wu Y, Liu W, Liang Q and Zhang L (2006) Detection and transcript expression of S-RNase gene associated with self-incompatibility in apricot

در ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ۲۵ ژنوتیپ دو باند نشان دادند و ژنوتیپ‌های اسجیل (چناران)،  $m-1$  و لیان ۳، جواهر ده ۳، 4M-12، بی‌نام یک، بی‌نام ۲، و لیان ۶، و لیان ۴، 86-b3-4 و 86-b3-4 یک باند نشان دادند. این در حالی بود که ژنوتیپ‌های اسجیل (چناران)، و لیان ۶، 86-b3-4، 4M-12، و لیان ۳ و لیان ۴ در هر دو جفت آغازگر یک باند نشان دادند و ژنوتیپ برجی نیشابور یک در هر دو جفت آغازگر هیچگونه باندی تولید نکرد (جدول ۵ و شکل ۴). اندازه باندهای بزرگ‌تر بدست آمده با استفاده از جفت آغازگر PaConsi-F/ EM PC5consRD نسبت به باندهای حاصل از جفت آغازگر EM PC2consFD/ EM PC3consRD به این دلیل بود که این جفت آغازگر ناحیه وسیع‌تری از ژن S-RNase را تکثیر کرده است که شامل اینترون اول و دوم می‌باشد. مطالعاتی که تاکنون برای شناسایی آلل‌های S آلو صورت گرفته است بیشتر مربوط به اینترون دوم می‌باشد چون اینترون دوم در ناحیه با تنوع بالا قرار دارد و اکثر آغازگرهای طراحی شده در این ناحیه قرار دارند به عبارتی تنوع آلل‌های S بیشتر مربوط به تنوع اندازه

(*Prunus armeniaca* L.). Molecular Biology Reports, 33: 215-221.  
Guerra M E, Rodrigo J, Lopez- Corrales M and Wunsch A (2009) S-RNase genotyping and incompatibility group assignment by PCR and pollination experiments in Japanese plum. Plant Breeding, 128: 304-311  
Halasz J (2007) DNA-based S-genotyping of Japanese Plum and Plum cultivars to clarify incompatibility relationship. HortScience, 42: 46-50.  
Halasz J, Fodor A, Hegedus A, Pedryc A (2008) Identification of a new self-incompatibility allele (S31) in a Hungarian almond cultivar and its reliable detection. Scientia Horticulturae, 116: 448-451.  
Hegedus A Halasz J (2006) Self- incompatibility in plums (*Prunus salicina* Lindl., *Prunus cerasifera* Ehrh. and *Prunus domestica* L.). International Journal of Horticultural Science, 12: 137-140.  
Ishimizu T, Inoue K, Shimonaka M, Satio T, Terai A, Noriok S (1999) PCR-based method for identifying the S-genotypes of Japanese pear cultivars. Theoretical and Applied Genetics, 98: 961-967.  
Kao T Tsukamoto T (2004) The molecular and genetic bases of S-RNase-based self-incompatibility. The Plant Cell, 16: S72-S83.  
Kitahara K, Matsumoto S, Yamamoto T, Soejima J, Kimura T, Komatsu H Abe K (2005) Molecular characterization of apple cultivars in Japan by S-RNase

- analysis and SSR markers. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 130: 885–892.
- Lopez M, Vargas FJ and Batlle I (2006) Self-incompatibility in almond genotypes: A review. *Euphytica*, 150: 1-16.
- Murfett J, Cornish EC, Ebert PR, Bonig I, McClure BA and Clarke AE (1992) Expression of a Self-Incompatibility Glycoprotein (S2-Ribonuclease) from *Nicotiana glauca* in Transgenic *Nicotiana tabacum*. *The Plant Cell*, 9: 1063-1074.
16. Murray HG, Thompson WF (1980) Rapid isolation of high molecular weight DNA. *Nucleic Acids Research*, 8: 4321-4325.
- Ortega E, Sutherland BG, Dicenta F, Boskovic R, Tobutt KR (2005) Determination of incompatibility genotypes in almond using first and second intron consensus primers: detection of new S-alleles and correction of reported S-genotypes. *Plant Breeding*, 124: 188–196.
- Sanchez R, Dicenta F, Martinez-Gomez P (2004) Identification of S-alleles in almond using multiple PCR. *Euphytica*, 138: 263-269.
- Sanzol J, Herrero M (2002) Identification of self-incompatibility alleles in pear cultivars (*Pyrus communis* L.). *Euphytica*, 128: 325–331.
- Sapir G, Raphael AS, Shafir SH, Goldway M (2008) S-RNase based S-genotyping of Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl.) and its implication on the assortment of cultivar-couples in the orchard. *Scientia Horticulturae*, 118: 8-13.
- Sonneveld T, Tobutt KR, Robbins TP (2003) Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility (S) alleles S1 to S16 using consensus and allele-specific primers. *Theoretical and Applied Genetics*, 107: 1059–1070
- Stern RA, Sapir G, Shafir S, Dag A, Goldway M (2007) The appropriate management of honey bee colonies for pollination of Rosaceae fruit trees in warm climates. *Middle Eastern Russian Journal of Crop Science and Biotechnology*, 1: 13–19.
- Sutherland BG, Robbins TP, Tobutt KR (2004) Primers amplifying a range of *Prunus* S-alleles. *Plant Breeding*, 123: 582–584.
- Szabo Z (2003) Plum (*Prunus domestica* L.). In: Kozma, P, Nyeki J, Soltesz M, Szabo Z (Eds): *Floral Biology, Pollination and Fertilisation in Temperate Zone Fruit Species and Grape*. pp. 515–522. Akademiai Kiado, Budapest.
- Szabo Z, Nyeki J, Andrasfalvy A, Soltesz M (1999) Association of European plum varieties in the orchards. *International Journal of Horticultural Science*, 5: 21–24.
- Tao R, Watari A, Hanada T (2007) Self-compatible peach (*Prunus persica*) has mutant versions of the S haplotypes found in self-incompatible *Prunus* species. *Plant Molecular Biology*, 63: 109–123.
- Tobutt KR, Bodkovic R, Cerovic R, Sonneveld T, Ruzic D (2004) Identification of incompatibility alleles in the tetraploid species sour cherry. *Theoretical and Applied Genetics*, 108: 775–785.
- Ushijima K, Sassa H, Tao R, Yamane H, Dandekar AM, Gradziel TM, Hirano H (1998) Cloning and characterization of cDNAs encoding S-RNases from almond (*Prunus dulcis*): primary structural features and sequence diversity of the S-RNases in Rosaceae. *Molecular and General Genetics*, 260: 261–268.
- Vilanova S, Badenes ML, Burgos L, Martinez-Calvo J, Llacer G and Romero C (2006) Self-compatibility of two apricot selections is associated with two pollen-part mutations of different nature. *Plant Physiology*, 14: 629–641.
- Wang H, Zhang K, Su H, Naihaoye K (2010) Identification of the S-genotypes of several sweet cherry (*Prunus avium* L.) cultivars by AS-PCR and pollination. *African Journal of Agricultural Research*, 5: 250-256.
- Watari A, Hanada T, Yamane H, Esumi T, Tao R, Yaegaki H, Yamaguchi M, Beppu K and Kataoka I (2007) A low transcriptional level of Se-RNase in the Se-haplotype confers self-incompatibility in Japanese plum. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 132: 396-406.
- Yamane H, Tao R, Sugiura A (1999) Identification and cDNA cloning for S-RNases in self-incompatible Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl. cv. Sordum). *Plant Biotechnology*, 16: 389–396.
- Zhang SJ, Huang SX, Heng W, Wu HQ, Zhang S L (2008) Identification of S-genotypes in 17 Chinese cultivars of Japanese plum (*Prunus salicina* Lindl.) and molecular characterisation of 13 novel S-alleles. *Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, 83: 635–640.