

## متاژنومیکس و کاربرد آن در شناسایی تنوع ژنتیکی اکوسیستم‌های میکروبی

### Metagenomics and its application in identification of genetic diversity of microbial ecosystems

میثم طباطبائی<sup>\*</sup>، هلن پورمظاہری<sup>۲</sup>

- ۱ استادیار بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  
-۲ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

Tabatabaei M<sup>1\*</sup>, Pourmazaheri H<sup>2</sup>

1. Assistant Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)  
2. MSc Student, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

\* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Meisam\_Tabatabaei@abrii.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۲ - تاریخ پذیرش: ۹۰/۷/۵)

#### چکیده

ریز سازواره‌ها پایه و اساس حیات بر روی کره زمین بوده و درجه بالایی از تنوع زیستی را عرضه می‌نمایند. این تنوع عظیم ژنتیکی و زیستی می‌تواند در جهت افزایش شناخت ژن‌های جدید، مسیرهای متابولیک و محصولات آن مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی تنوع ژنتیکی و زیستی ریز سازواره‌ها بخش مهمی از تحقیقات علمی را تشکیل می‌دهد. بسیاری از ریز سازواره‌هارا نمی‌توان در شرایط آزمایشگاه کشت داد که این موضوع در درک فیزیولوژی، ژنتیک و اکولوژی جامعه میکروبی محدودیت ایجاد می‌نماید. راه حل مناسب رفع این مشکل استفاده از دانش و ابزاری جامع به نام متاژنومیکس یعنی همسانه‌سازی با استفاده از روش‌های مستقل از کشت است. یکی از بهترین روش‌ها در هدف گیری ژن در متاژنومیکس PCR-DGGE است که در آن محصول DNA PCR استخراج شده از جوامع میکروبی، به کمک آغازگرهای اختصاصی 16S rRNA در گروه‌های عمدۀ میکروبی مانند باکتری‌ها، آرکی‌ها و استفاده از آغازگرهای 18S rRNA در گروه‌های یوکاریوتی به دست می‌آید که نتیجه آن تکثیر قطعاتی هم اندازه و با طول یکسان می‌باشد. DGGE تکنیکی برای جداسازی قطعات اسد نوکلئیک است که از لحاظ اندازه توالی یکسان بوده اما به لحاظ محتوای توالی متفاوت هستند. با استفاده از روش DGGE، تشخیص بیماری‌های میکروبی و شناسایی ریز سازواره هادر مقیاس بزرگ می‌تواند ساده‌تر و سریع‌تر به دست آید. در این بررسی سعی شده به طور خلاصه به مکانیسم اجرا، کاربردها، مزایا و معایب این فناوری پرداخته شود.

#### واژه‌های کلیدی

تنوع ژنتیکی،  
جوامع میکروبی،  
متاژنومیکس،  
.DGGE  
.DNA

## مقدمه

دبیال آن در پیشرفت عرصه‌های کاربردی مطالعات میکروبی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، پزشکی، صنعت نفت و غیره نقش بسزایی داشته باشد.

## متاژنومیکس

بیش از ۹۹ درصد از شبه هسته دارانی محیط زیست را نمی‌توان با استفاده از فناوری‌های کشت میکروبی موجود، در شرایط آزمایشگاه کشت داد که این موضوع سبب محدودیت در درک فیزیولوژی، ژنتیک و اکولوژی جامعه میکروبی می‌گردد. راه حل مناسب رفع این مشکل استفاده از دانش و ابزاری جامع به نام متاژنومیکس است که در آن بدون کشت میکرووارگانیسم‌ها، تنوع میکروبی موجود در محیط مورد نظر بررسی می‌شود. در این روش، DNA کل میکروبی<sup>۲</sup> به طور مستقیم از نمونه‌های زیست محیطی استخراج شده و ارزیابی‌های ژنتیکی بر روی آن به انجام می‌رسد. پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های توالی یابی از قبیل شات<sup>۳</sup> گان، پایروسکونسینگ<sup>۴</sup> و روش‌های محاسباتی و بیوانفورماتیک سبب پیشرفت دانش متاژنومیکس در ارائه دیدگاهی اجمالی از زندگی ریزاسازواره‌های غیر قابل کشت<sup>۵</sup> در آزمایشگاه گردیده است. در واقع متاژنومیکس عرصه‌ای جدید و ترکیب یافته از زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک است. تحقیقات متاژنومیکسی با مطالعات نظم آرایی ژن<sup>۶</sup>، ژنومیکس عملکردی و بیان ژن‌ها، پروتئومیکس، متابولومیکس و همچنین مطالعات میکروسکوپی ارتباط و همبستگی نزدیک داشته و در حال حاضر بیش صحیحی را در حل مشکلاتی از قبیل تکامل ژنوم و عدم توانایی ما در درک جایگاه ویژه اغلب میکرووارگانیسم‌هایی که نمی‌توان کشت خالصی از آنها تهیه نمود، ارائه داده است (Allen and Banfield 2005 ; Pontes et al. 2007) (Allen and Banfield 2005 ; Pontes et al. 2007). این فناوری به صورت یک فرایند چند مرحله‌ای بوده که متمکی بر چهار مرحله اصلی می‌باشد (شکل ۱). ۱- جداسازی ماده ژنتیکی کل موجودات زنده میکروسکوپی موجود در محیط مورد مطالعه


امروزه برای درک بهتر فرآیندهای زنده اغلب می‌توان آنها را در سیستم‌های ساده مانند جانداران کوچک و میکروسکوپی (ریز سازواره‌ها) که پایه و اساس حیات بر روی کره زمین بوده و همچنین تنوع زیستی با طیف وسیعی را عرضه می‌نمایند، به جای یک ساختار پیچیده مانند انسان مورد مطالعه قرار داد. ریز سازواره‌ها دارای بسیاری از خواص مشابه با موجودات زنده پیچیده هستند. به طور مثال بسیاری از آنها دارای توانایی تخریب مواد زاید بوده و همچنین قادر به ساخت داروهای جدید در زمینه ژنتیکی، ساخت پلاستیک‌های سازگار با محیط زیست و یا حتی ساخت برخی از مواد تشکیل دهنده غذا هستند. در نتیجه، شناسایی تنوع ژنتیکی و زیستی ریز سازواره‌ها بخش مهمی از تحقیقات علمی را شامل می‌شود (Hugenholtz and Pace 1996; Rappe and Giovannoni 2003; Shelswell 2004 سلول‌های شبه هسته داران  $10^{30} \times 10^{4-6}$  براورد شده است Schloss and Handelsman 2005) که از  $10^6$  تا  $10^8$  گونه ژنتیکی مجزا (گروه‌های متمایز تاکسونومیکی مبتنی بر تجزیه توالی ژن) تشکیل شده اند (Amman et al. 1995). این تنوع عظیم ژنتیکی و زیستی می‌تواند در بهبود ساخت ژن‌های جدید، مسیرهای متابولیک و محصولات آنها مورد استفاده قرار گیرد (Cowan 2000). بررسی‌ها نشان داده اند که در روش "کشت میکروبی"<sup>۷</sup> تنها بخشی از تنوع میکروبی در آنالیزها وارد می‌شود و بخش عظیمی از جامعه میکروبی از دست می‌رود Amman et al. 1995; Hugenholtz and Pace 1996;) (Hugenholtz et al. 1998) و به تبع آن نیز نتایج حاصله نمی‌تواند آبینه تمام نمایی از آنچه در محیط مورد بررسی رخ می‌دهد به حساب آید. توسعه فناوری‌های متاژنومیکس در بیش از ۵ سال گذشته، دسترسی به بسیاری از اطلاعات ژنتیکی شبه هسته داران موجود در نمونه‌های زیست محیطی را بدون استفاده از کشت Schlossand Handelsman 2003 (Stevenson et al. 2004) فراهم کرده است (Stevenson et al. 2004). این مسئله می‌تواند کمک قابل توجهی به ادراک جامع و کامل محققین از جامعه میکروبی نموده و به

<sup>2</sup> Total microbial DNA<sup>3</sup> Shotgun<sup>4</sup> Pyrosequencing<sup>5</sup> Unculturable<sup>6</sup> Gene array<sup>1</sup> Microbial culture

بیوشیمیایی منحصر بفردشان (مانند ترکیب دیواره های سلولی) بهتر عمل کند.

روش غیر مستقیم که در آن سلول های میکروبی موجود در ماتریس نمونه، پیش از استخراج DNA جداسازی می شوند، سبب به حداقل رساندن مشکلات ناشی از آلاینده های معادنی و بالاخص آئی می شود (Bey et al. 2010)، اما در این روش، میزان استحصال شده کاهش می یابد و علاوه بر آن، بسته به DNA شدت اتصال سلول ها به ماتریس نمونه محیطی، راندمان استخراج تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد یا منفی شود (Tabatabaei et al. 2010). لذا بیشتر مطالعات میکروبی با تکیه بر روش های مستقیم استخراج DNA انجام می شود. مزیت مهم روش مستقیم استخراج DNA آن است که از نظر کمی بازده بیشتری نسبت به روش غیر مستقیم فراهم می نماید. از سوی دیگر با توجه به اعمال روند استخراج بر روی کل نمونه مورد مطالعه، احتمال حذف بخشی از نمونه آن گونه که در روش های غیر مستقیم محتمل است و منجر به انحراف تحقیقات و متعاقب آن باعث پیچیده تر شدن نتایج بررسی جوامع میکروبی می گردد، متفقی می شود (Bey et al. 2010).

راهبردهای غنی سازی ژنوم<sup>۱</sup> می تواند با هدف گیری اجزای فعال جمعیت میکروبی مورد استفاده قرار گیرد (Borneman 1999 ; Urbach et al. 1999). تکنیک ایزوتوپ پایدار نشاندار (SIP)، شامل استفاده از یک سوبسٹرای ایزوتوپ پایدار نشاندار بوده که در آن جداسازی براساس شب چگالی سانتریفیوژ می باشد و DNA و RNA در این تکنیک بر اساس وزنشان از هم جدا می گردند. برای نمونه، با بهره گیری از نشاندار  $^{13}\text{CH}_3\text{OH}$  متاژنومی خاک جنگل مورد بررسی قرار گرفت و منجر به شناسایی پروتوباکترهای متیلوتروف<sup>۲</sup> و ژن جدید دهیدروژناز متانول<sup>۳</sup> (mxaF) شد که متعلق به تاکسای اسیدوباکترهای است



شکل ۱- فرایند متاژنومیکس، (الف) جدا سازی ریز سازواره ها؛ (ب) استخراج ماده ژنتیکی؛ (ج) انتقال ماده ژنتیکی به ناقل؛ (د) انتقال به میزان مورد نظر، ساخت کتابخانه و انتخاب نوتریپ ها؛ (ه) تجزیه و تحلیل مواد ژنتیکی در کتابخانه متاژنومیکس.

-۲- انتقال مواد ژنتیکی به ناقلها -۳- ساخت کتابخانه ژنومی ۴- تجزیه و تحلیل مواد ژنتیکی در کتابخانه متاژنومیکس. اطلاعات بدست آمده از کتابخانه های متاژنومیکسی می تواند نقش بسیار موثری در توسعه جنبه های کاربردی میکروارگانیسم ها در صنعت، کشاورزی، پزشکی و محیط زیست داشته باشد. گستره بهره برداری از اطلاعات فراهم آمده از فناوری متاژنومیکس به گونه ای است که می تواند در ایجاد تعامل بهتر جامعه انسانی با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد (Shelswell 2004).

### روش های استخراج ماده ژنتیکی در مطالعات متاژنومیکسی

#### روش های استخراج DNA

نوع روشن استخراج DNA مورد استفاده در مطالعات متاژنومیکس، نقش بسیار موثری در اعتبار و حصول اطمینان از نتایج، در بررسی غنا و تنوع میکروبی موجود در نمونه دارد. راهبرد اصلی جهت بدست آوردن DNA متاژنومی، تهیه سلول ها و لیز نمودن مستقیم آنهاست. لیز نمودن مستقیم به دو روش مکانیکی و شیمیایی صورت می گیرد مطالعات نشان داده که روش های مکانیکی تنوع بیشتری را در مقایسه با تیمارهای شیمیایی فراهم می کنند (Niemi et al. 2001). با این حال، لیز شیمیایی می تواند DNA با وزن مولکولی بالاتری را استحصال کرده و در برخی از تاکسون ها با توجه به برخی ویژگی های

<sup>1</sup> Genome enrichment strategies

<sup>2</sup> Stable-isotope probing

<sup>3</sup> Methylotroph proteobacteria

<sup>4</sup> Novel methanol dehydrogenases

مصنوعی RNA جدا شده استفاده کرد(Ercolini 2004). از روش های ذکر شده در بحث استخراج DNA می توان در استخراج RNA نیز استفاده نمود؛ مانند آنچه که در قسمت قبل به آنها اشاره گردید می توان از روش ایزوتوپ پایدار نشاندار (SIP) و نشاندارهای  $^{13}\text{CH}_3\text{OH}$  و BrdU نام برد. در هسته داران استفاده از mRNA بصورت گسترده ای کاربردی شده است که البته لازم به ذکر است اخیرا در مطالعه متاژنوم شبه هسته داران از این روش نیز بهره گیری می شود. این روش، راهبردی عملی در ساخت کتابخانه های متاژنومیکسی cDNA جهت شناسایی بهتر ژن های عملکردی یوکاریوتی ارائه می دهد (Urbach et al. 1999).

### هدف گیری ژن

واکنش زنجیره ای پلیمراز<sup>۴</sup> (PCR) ژن های اختصاصی با قابلیت های ویژه متابولیکی و یا توانایی تجزیه کنندگی سوبستراتی خاص به طور گسترده در شناسایی جوامع میکروبی کاربرد دارد. برای نمونه می توان به هدف گیری ژن هایی مانند مтан مونو اکسیژناز، متانول دهیدروژناز و آمونیاک مونو اکسیژناز در شناسایی متابوتروفها اشاره کرد. البته استفاده از PCR در ردبایی ژنی ویژه به عنوان ابزاری در کشف فاکتورهای حیاتی با دو اشکال عمده روبرو است نخست، طراحی آغازگر که به اطلاعات موجود در توالی بستگی دارد و خطاب در آن ادامه فرایند را با اشکال روبرو می سازد. دوم اینکه فقط قطعه ژن ساختاری توسط PCR تکثیر می شود و به گام های دیگر برای دسترسی به تمام طول ژن نیاز است، البته تکثیر شده ها را می توان نشان دار کرده و به عنوان کاوشگر در شناسایی کل طول ژن (های) موجود در کتابخانه های متداول متاژنومیکس استفاده کرد. روش مبتنی بر PCR می تواند برای دسترسی به نواحی اطراف پایین دست و بالا دست ژن و رسیدن به طول کامل ژن از روش هایی چون گام زنی سریع عمومی<sup>۵</sup> (Henckel et al. 1999 ; Mishra et al. 2002) PCR دسته ماهی تابه ای<sup>۶</sup> (Myrick and Gelbart 2002)، PCR با آغازگرهای تصادفی<sup>۷</sup> (Megonigal MD et al. 2000)

(Radajewski et al. 2002). ریز سازواره های فعال در حال رشد نیز می توانند با ۵-برومو-۲-دئوكسیوریدین<sup>۱</sup> نشاندار شوند و RNA یا DNA نشاندار شده توسط راهکارهای ایمنولوژیکی یا سانتریفیوژ شبیه چگالی از هم جدا شوند (Urbach et al. 1999). دورگ سازی کاهشی بازدارنده<sup>۲</sup> (SSH) می تواند تفاوت های ژنتیکی بین ریز سازواره هارا شناسایی نماید، از این رو روشی قدرتمند برای غنی سازی یک ژن خاص می باشد. در این راهبرد، سازگارسازها به توده های DNA متصل شده و دورگ گیری کاهشی، انتخاب قطعات منحصر به فرد DNA را در هر یک از نمونه ها امکان پذیر می سازد. این امر به طور معمول در تجزیه و تحلیل تفاوت های ژنتیکی در بیان ژن کاربرد دارد (Green et al. 2001). تاکنون روش مطالعه الگوهای موجود در بیان ژن، تقریباً به طور انحصاری در هسته داران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل بیان متمایز<sup>۳</sup> (DEA) ابزار موثری در خصوص غنی سازی است. بیان صفات نمونه متاژنومیکسی را می توان در مقایسه با پیش و پس از قرار گرفتن در معرض سوبستراتی خاص و یا افزایش عوامل زیستی خارجی، مورد بررسی قرار داد. در این روش، بیان ژن ها برای شناسایی فعالیت های خاص تحت نظارت قرار داده می شوند. این نوع رویکرد در شناسایی ژن های باکتریایی با Bowler et al. (1999).

### روش های استخراج RNA

فناوری استخراج RNA از نمونه های زیست محیطی با روش های استخراج DNA تا حد زیادی مشابه است. پروتکل هایی به منظور کاستن تخریب فیزیکی و فعالیت RNase که علت عدمه کاهش بازده تکنیک های استخراجی است، طراحی شده اند. جهت جلوگیری از تخریب و کاهش بازده، ضروری است نمونه های اسید نوکلئیک به دست آمده سریعاً مورد پردازش قرار گرفته و یا بلا فاصله پس از استخراج در دمای ۸۰ - درجه سانتی گراد منجمد گردند. همچنین برای به حداقل رساندن تخریب RNA می توان از رسوب دهی آرانی سلولی و پوشش

<sup>4</sup> Polymerase chain reaction

<sup>5</sup> Universal fast walking

<sup>6</sup> Panhandle PCR

<sup>7</sup> Random primed PCR

<sup>1</sup> 5-bromo-2-deoxyuridine

<sup>2</sup> Suppressive subtraction hybridization

<sup>3</sup> Differential expression analysis

در متاژنومیکس PCR-DGGE است که علاوه بر کاربرد در مطالعات نمونه های محیطی، روشی محبوب برای مطالعه میکروب های روده انسان و حیوانات نیز محسوب می شود (Kim et al. 2004 ; Possemiers et al. 2007). قابل اعتماد بودن، داشتن تکرار پذیری، سریع و تا حدودی ارزان بودن، بهترین پیشنهاد در این نوع تحقیقات است. همچنین می توان با استفاده از این روش، نمونه های متعددی را به صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بنابراین امکان پیگیری و ردیابی تغییرات در جمعیت های میکروبی نیز وجود دارد (Muyzer and Smalla 1998).

- الکتروفورز ژل شیب دار و اسرشته ساز DGGE روش DGGE توسط لئونارد لرمان و استوارت فیشر<sup>۱۹</sup> در دانشگاه ایالتی نیویورک<sup>۲۰</sup> در آلبانی ابداع شد (Fischer and Lerman 1979). DGGE باستفاده از مقدار کمی نمونه DNA (یا RNA) متاژنوم کار می کند و توسط ژل آکریل آمید حاوی عوامل و اسرشت کننده DNA (اوره و فرمامید) در طول ژل الکتروفورز می شود. محققین نشان دادند قطعاتی که در آنها جهش ایجاد شده است، با مقایسه محل ذوب DNA در طول شیب ژل در کنار یکدیگر قابل شناسایی هستند (Myers and Lerman 1987). اولین بار جرارد مویزر<sup>۲۱</sup> در سال 1979 از زیر واحد کوچک ریبوزوم برای رمزگذاری ژن ها در DGGE بهره گرفت و از آن پس این مدل تبدیل به یک روش گسترده و کارآمد در اکولوژی میکروبی شد (Fischer and Lerman 1979). اصول فوق الذکر بر این مبنای است که محصول PCR استخراج شده از جوامع میکروبی، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی 16S rRNA 16S برای گروه های عمدۀ میکروبی مانند باکتری ها، آرکتا<sup>۲۲</sup>، و 18S rRNA در گروه های یوکاریوتی به دست می آید که نتیجه آن تکثیر قطعاتی هم اندازه و با طول یکسان می باشد. بنابراین محصول PCR فوق الذکر نمی تواند توسط الکتروفورز ژل آگاروز از یکدیگر جدا شده و چندشکلی مورد انتظار را ایجاد کنند. با این حال، تغییرات توالی (محتوای GC) در بین rRNA های مختلف میکروبی،

معکوس<sup>۱</sup> و PCR مبتنی بر آداتپور<sup>۲</sup> (Liu and Whittier 1995) استفاده کند. از این روش ها در بازیابی انواع ژن های جدید<sup>۲</sup>، ۵- دی کتو گلوکونیک اسید ردوکتاز از DNA نمونه محیط زیستی با موفقیت استفاده شده است.

**روش های مورد استفاده در متاژنومیکس**  
امروزه روش هایی که بر پایه آنالیز مستقیم توالی زیر واحد کوچک<sup>۳</sup> (SSU) ژن ریبوزومی (rDNA) تکیه دارند به سرعت جایگزین روش های کشت آزمایشگاهی شده اند، زیرا در این روش ها راهکار مناسبی برای مقایسه ترکیب و ساختار جوامع میکروبی ارائه می شود. چنین روش هایی نظیر<sup>۴</sup> ARDRA، CDGE<sup>۵</sup>.TGGE<sup>۶</sup>.AFLP<sup>۷</sup>.T-RFLP<sup>۸</sup>.RAPD<sup>۹</sup>.SSCP<sup>۱۰</sup> و HA<sup>۱۱</sup> و PTT<sup>۱۲</sup> و در نهایت توالی یابی DNA در تجزیه و تحلیل اسید نوکلئیک به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر آنها، روش های دیگر تجزیه و تحلیل های شمیایی نظیر نشانگرهای زیستی نیز دارای کارایی بالا هستند، برای نمونه می توان به آنالیز اسید چرب فسفولیپید (PLFA)<sup>۱۳</sup> در تعیین مشخصه های جوامع میکروبی اشاره کرد. از سوی دیگر، برای تشخیص میکروسکوپی سلول های خاص میکروبی، از دورگ سازی فلورسانس در محل<sup>۱۴</sup> (FISH) استفاده می شود. در این زمینه برخی تغییرات در راستای افزایش شدت سیگنال توسعه یافته اند که به برخی از آنها نظیر<sup>۱۵</sup> CARD-<sup>۱۶</sup>.HNPP-FISH<sup>۱۷</sup>.PNA-FISH<sup>۱۸</sup>.FISH و PCR درون بافتی می توان اشاره نمود. یکی از بهترین روش ها برای هدف گیری ژن

<sup>1</sup> Inverse PCR<sup>2</sup> Adaptor ligation PCR<sup>3</sup> Small subunit<sup>4</sup> Amplified ribosomal DNA restriction analysis<sup>5</sup> Single-strand conformation polymorphism<sup>6</sup> Random amplified polymorphic DNA<sup>7</sup> Terminal-restriction fragment length polymorphism<sup>8</sup> Amplified fragment length polymorphism<sup>9</sup> Temperature gradient gel electrophoresis<sup>10</sup> Constant denaturing gel electrophoresis<sup>11</sup> Heteroduplex analysis<sup>12</sup> Protein truncation tests<sup>13</sup> phospholipid fatty acid<sup>14</sup> Fluorescence in situ hybridization<sup>15</sup> Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies<sup>16</sup> Catalyzed reporter deposition fluorescence in situ hybridization<sup>17</sup> Peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridization<sup>18</sup> Recognition of individual genes<sup>19</sup> Leonard lerman and stuart Fischer<sup>20</sup> State University of New York<sup>21</sup> Gerard Muyzer<sup>22</sup> Archaea

حالی است که مولکول های DNA واسرشت شده، با سرعت کمی حرکت می کنند و یا اینکه در ژل متوقف می شوند. هر گونه تنوع توالی DNA در این حوزه، ذوب در دماهای مختلف را منجر شده و در نتیجه باعث مهاجرت رشته های مختلف به موقعیت های مختلف در ژل می گردد (شکل ۲ و ۴). این امر به DGGE قدرت تفکیک و ردیابی جهش در توالی ها را بدون اینکه قبل از این توالی ها آگاهی داشته باشیم، فراهم می کند. به همین دلیل از این روش علاوه بر مطالعه تنوع ژنتیکی، در تشخیص جهش در موجودات زنده نزدیک و مرتبط به هم نیز استفاده می شود (Tabatabaei et al. 2009). لازم به یادآوری است که با دانستن جایگاه توالی خاصی از یک یا چند میکروب در ژل اکریل آمید می توان به وجود یا عدم وجود آنها در نمونه های میکروبی نیز بی برد و در مطالعات گوناگون با اهداف مختلف میکروبیولوژیکی و زیست محیطی از الگوهای به دست آمده بهره برداری نمود (شکل ۳). برای مثال، واکنش زنجیره ای پلیمراز معمولی در DNA های بدست آمده از نمونه های زیست محیطی، می تواند الگوهای متفاوت توالی DNA را که نشان دهنده بسیاری از عوامل غالب میکروبی اند، تولید کند. با این حال، از آنجا که محصولات واکنش PCR در مطالعات متاثرnomی از لحاظ اندازه (جفت باز) مشابه هستند، جداسازی متعارف چنین محصولاتی توسط الکتروفورز ژل آکارز معمولی فقط یک تک باند را منجر می شود که نمی تواند تشريح شود. الکتروفورز DGGE می تواند با جدا کردن این محصولات بر اساس تفاوت در محتوای توالی های DNA با وساطت مواد شیمیایی واسرشت کننده این مسئله را برطرف نماید.


#### مزایا و معایب DGGE

روش های الکتروفورز وابسته به توالی<sup>۱</sup> مانند DGGE، ابزارهای مولکولی هستند که به مطالعه جمعیت های میکروبی در محیط های آبی و خاک، فاضلاب، مخازن نفت، مخازن تخمیر مواد غذایی، دستگاه گوارش، روده و غیره می پردازند. (Teske et al. 1996; Watanabe et al. 2000; Smalla et al. 2001; Possemiers et al. 2002; Gomes et al. 2003; Kim et al. 2007)


خواص مختلفی در تغییر حالت مولکول های DNA ایجاد می کند که اساس چندشکلی در گروه های میکروبی در DGGE است (Huges et al. 2001; Tabatabaei et al. 2009; Tabatabaei et al. 2010). اخیرا مطالعات نشان داده اند که DGGE برای ژن های عملکردی (به عنوان مثال ژن های موثر در احیای گوگرد، تثبیت نیتروژن و اکسیداسیون آمونیوم) نیز می تواند اطلاعات مناسبی در ارتباط با عملکرد میکروبی و روابط ژنتیکی آنها با گیاه یا جانور را به طور همزمان فراهم کند. علاوه بر این، مطالعه محیط های میکروبی پیچیده ای مانند خاک، فاضلاب، پساب صنعتی نظیر پساب کارخانه روغن نخل با استفاده از DGGE امکان پذیر شده است. برای مثال، غالیت باکتری *Methanosaeta concilii* در فرایند تولید متان از دانه روغنی به کمک DGGE مورد ردیابی قرار گرفته است (Tabatabaei et al. ; Tabatabaei et al. 2010). DGGE نوع خاصی از الکتروفورز است که در آن حرارت ثابت (حدود ۶۰ درجه سانتی گراد) و غلظت متفاوتی از مواد شیمیایی دواسرخت کننده استفاده شده و محصولات PCR معمولاً در ژل بر اساس روش (Muyzer and Smalla 1998) عمودی حاوی ۸ درصد پلی اکریل آمید (w/v) با بازه ضخامتی ۱-۵ میلی متر بارگیری می شود. شب واسرشتی ژل اکریل آمید به دست آمده در حضور اوره و فرمامید به صورت افزایشی از صفر در بالای ژل تا صد درصد در پایین ژل فراهم می گردد. پس از الکتروفورز، محصولات PCR به صورت باندهای مجزا از هم در ژل قرار گرفته و توسط اتیدیوم بروماید و یا نیترات نقره رنگ آمیزی می شوند. زمانی که توالی های ژن های هدف به حد آستانه ذوب خودشان رسیدند، دو رشته DNA از هم باز می شوند. جفت باز آدنین و تیونین، و سیتوزین و گوانین از لحاظ شیمیایی بطور متمایز ذوب می شوند. در واقع پیوند هیدروژنی بین جفت بازها با وساطت حرارت دستگاه و افزایش شب واسرشت توسط مواد شیمیایی واسرشت کننده (اوره و فرمامید) شکسته می شود. به طور کلی، قطعات DNA غنی تر از GC پایدارتر بوده و تا رسیدن به غلظت های بالاتر دو رشته ای باقی خواهند ماند و این دورشته ای ماندن تا زمانی که میزان درصد لازم از عوامل ذوب کننده در طول ژل نرسد همچنان باقی می ماند. قطعه دو رشته ای بهتر می تواند در طول ژل اکریل آمید مهاجرت کند و این در

<sup>۱</sup> Sequence dependent electrophoresis (SDE)


نتایج مطالعات می تواند اطلاعاتی را در مورد تنوع میکروبی و همچنین ارزیابی پایداری جمعیت میکروبی ارائه دهد. برای مثال Xia et al. (2010) با تجزیه و تحلیل DGGE تایید کرد که جنس نیتروزوموناس دارای AOB<sup>1</sup> غالب در بیوفیلم بوده است. همچنین OMahony et al. (2009) برای تعیین تنوع میکروبیکتری های روده میزبان در سندروم روده تحریک پذیر و بررسی نمونه های بیوپسی مخاط از بیماران سندروم روده تحریک پذیر و مقایسه آنها با مدفوع از روش DGGE استفاده کرد. در ایران نیز (Kafili et al. 2009) از تجزیه و تحلیل PCR-DGGE در شناسایی لاكتوباسیل های غالب میکروبی پنیر سنتی لیقوان ایرانی پیش از تولید بهره برداشت. Long et al. (2010) از روش هایی مانند RFLP و TGGE، DGGE برای تجزیه و تحلیل تنوع قارچی و میکوریزی و نیز استخراج اسیدهای نوکلئیک یوکاریوتی و تعیین تنوع باکتریایی در عصاره DNA استفاده کردند. روش PCR-DGGE دارای این مزیت است که نیاز به استفاده از دانش قبلی در ارتباط با جمعیت میکروبی ندارد. در واقع این روش نوعی انگشت نگاری از ژن است که می تواند الگوی تنوع ژنتیکی را در اکوسیستم پیچیده میکروبی مانند قطعات دستگاه گوارش، خاک، رسوبات، عمق دریاها، رودخانه ها، چشممهای آب گرم و غشاهای زیستی بررسی کند. مزیت عمدی این روش، پتانسیل آن در مشاهده چشمی و نظارت بر تغییرات رخ داده در جوامع مختلف میکروبی است که تحت اثر تغییرات و یا تیمارهای مختلف قرار دارند. این روش دارای قدرت بالایی در تفکیک سریع و کارآمد DNA های تکثیر شده با طول یکسان توسط PCR است و این قدرت تفکیک می تواند به میزان حتی یک باز باشد (Xia et al. 2010). با وجود این واقعیت که DGGE نتایجی تولید می کند که دقیق تر و قابل اعتماد تر از روش های پیشین ژل الکتروفورتیک است، با این حال دارای مشکلاتی نیز می باشد. برخی محدودیت های DGGE عبارتند از: ضعف های اجباری PCR (Wintzingerode et al. 1997) و بارگذاری با زحمت زیاد نمونه ها که تاثیری بالقوه در ارزیابی و در نتیجه شناسایی جامعه میکروبی دارد که منجر به کاهش کارایی می شود (Turon and Cloete 2000).



شکل ۲- انگشت نگاری مبتنی بر PCR-DGGE متابوژن ها در ژل اکریل آمید ۴۰ تا ۶۰ درصد و آرکتا در ژل اکریل آمید ۵۰ تا ۶۰ درصد با استفاده از آغازگرهای متابوژنی و آرکتاپی. چاهک ۱ (a): متابوژن های موجود در بیورآکتور بی هوازی، چاهک ۱ (b): آرکتاها موجود در بیورآکتور بی هوازی، چاهک ۲ و ۳: *Methanosaeta concilii* (SamaliEB and Samali15).



شکل ۳- نمایش الگوی جدا شدن نوارهای DNA در روی ژل. R: الگوی مرجع، A: میکروب ۱، B: میکروب ۲، C: میکروب ۳، M: مخلوط هر سه میکروب، S: نمونه ناشناخته (گیره جی سی متصل به قطعات تکثیر شده از جدا شدن دو رشته در درون ژل جلوگیری می نماید).



شکل ۴- استفاده از الگوی قطعات تکثیر شده جامعه میکروبی نمونه های گوناگون محیطی در بررسی روابط فیلوزنوتیکی میکروبیهای موجود در آنها

<sup>1</sup> Ammonia-oxidizing bacteria

رفتار ذوب مولکول به عنوان یک روش اولیه برای جدا کردن قطعات بر روی ژل، کار می کند. تفاوت اصلی آن است که در TGGE به جای شیب شیمیایی، شیب دما استفاده می شود (Muyzer and Smalla 1998). T-RFLP می تواند به منظور ارائه برخی اطلاعات فیلوجنتیک در نظر گرفته شود، که در آن بر اساس تجزیه و تحلیل محدودیت قطعه می توان برخی از داده های کمی اطلاعات فیلوجنی را ندارند، بدست آورد بعنوان مثال (Osborn et al. 2000, Dollhopf et al. 2001, Diez et al. 2001) نشان دادند که T-RFLP در برخی از ژن های کاربردی که دارای اندازه قطعات ژن نامتناسب برای DGGE هستند، مناسب می باشد. همچنین T-RFLP ممکن است از برخی مشکلات مرتبط با آغازگر DGGE اجتناب کند. همچنین (Zare-Karizi et al. 2010) در مطالعات مشابه خود از روش بررسی تنوع کنفورماسیون توالی های تک رشته ای<sup>۱</sup> (SSCP) به دلیل ساده تر بودن مراحل کار، مقرون به صرفه و در دسترس بودن برای اسکن جهش استفاده کرده اند.

### تجهیزات تجاری دستگاه

تولید کنندگان عمدۀ دستگاه DGGE شامل Bio-Rad ، INGENY و CBS هستند که CBS ارزان ترین نوع و INGENY گران ترین نوع را ارائه داده است. متداول ترین نوع مورد استفاده در موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها Bio-Rad است، اگرچه مشکلاتی در مدل Bio-Rad وجود دارد که تعدادی از این مشکلات عبارتند از: کیفیت ضعیف ژل (به علت عدم تحرک کافی در ژل، حالت فازی نامناسب، به وجود آمدن حباب در ژل و غیره)، شروع سریع الکتروفورز پس از بارگذاری نمونه، شکسته شدن صفحات شیشه ای ظرف آن و سایر قطعات و هزینه های بالای تعویض آنها، نیاز به برداشتن بخش های سنگین بافر سیستم DGGE برای قرار دادن ژل در آن، برداشتن ژل، اضافه کردن نمونه ها و غیره (این امر احتمال شکستن عنصر گرم کننده و خنک کننده را در طول بارگیری بافر و ژل و تمیز کردن افزایش می دهد)، تعداد محدود

نقاط قوت تکنیک DGGE. این تکنیک به تنها یک و بدون استفاده همزمان روش های دیگر چون FISH قادر به شناسایی الگوی کامل جمعیت میکروبی نخواهد بود (Muyzer et al. 1993). تنوع میکروبی منعکس شده توسط الگوهای DGGE تنها به گونه های غالب مربوط است؛ بنابراین بطور کامل فلور میکروبی و تعداد گونه های واقعی موجود در نمونه را نشان نمی دهد (Huaide et al. 2009). در نمونه هایی که شامل تعداد زیادی 16S rRNA مختلف هستند، در صورتی که تجزیه و تحلیل دقیق مورد نظر باشد، لازم است از آغازگرهای مشخص تری بهره گرفت. Misook et al. (2010) برای مکان یابی اگزون ۴،۲،۱ و ۵ در ژن hTERT، یکی از ژن های موثر در فعالیت آنزیم تلومراز، به طور جداگانه از DGGE استفاده کردند، زیرا در ژل سایر روش ها الگوهای ذوب مبهمی مشاهده می شد، در حالی که DGGE از آغازگرهای طراحی شده برای همان روش ها استفاده می کند. برخی از معایب عمده و یا محدودیت های متعارف مانند کم بودن سرعت عمل، پایین بودن قدرت تشخیص و دقت و صحت طبقه بنده می تواند از طریق روش های کشت مستقل بر طرف شوند. یکی دیگر از نواقص آن است که هیچ استاندارد تعیین شده ای برای ژل DGGE و مقدار محصول PCR ورودی وجود ندارد. الکتروفورز DGGE همیشه می تواند توالی هایی را که در یک باز متفاوتند، جدا کند اما توالی های متفاوت در باز های متعدد به راحتی جدا نمی شوند. ویژگی های حاصل از انتخاب نمونه، استخراج DNA، رونویسی معکوس، طراحی آغازگر، شرایط PCR و پاکسازی PCR روی نتایج تکنیک DGGE تاثیر گذارد. هر مرحله از تجزیه و تحلیل مولکولی DGGE می تواند بر هر مرحله پایین دست تاثیر گذارد. تجزیه و تحلیل DGGE کاملاً پیچیده بوده و حساس به مشکلات PCR است و در نتیجه بایستی توجه ویژه ای به این مرحله گردد. محدودیت ها باید قبل از به کار گیری روش به خوبی درک شوند؛ با توجه به افزایش مشکلات DGGE، محققان به کشف روش های جدیدی که قادر به کم کردن برخی از مشکلات هستند روی آورده اند. امروزه روش TGGE<sup>۱</sup> به عنوان تکنیکی قابل اطمینان و مناسب تر توسعه داده شده است. روش TGGE نیز مانند DGGE با بهره گیری از

<sup>۱</sup> Single strand configuration polymorphisms

<sup>۱</sup> Temperature gradient gel electrophoresis

## منابع

- Allen EE, Banfield JF (2005) Community genomics in microbial ecology and evolution. *Natural Review of Microbiology* 3:489-498.
- Amman RL, Ludwig W, Schleifer KH (1995) Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. *Review of Microbiology* 59:143-169.
- Bey BS, Fichot EB, Dayama G, Decho AW, Norman RS (2010) Extraction of high molecular weight DNA from microbial mats. *Journal of Bio Techniques* 49:631-640.
- Borneman J (1999) Culture-independent identification of microorganisms that respond to specified stimuli. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 65:3398-3400.
- Bowler LD, Hubank M, Spratt BG (1999) Representational difference analysis of cDNA for the detection of differential gene expression in bacteria: development using a model of iron-regulated gene expression in *Neisseria meningitidis*. *Journal of Microbiology* 145:3529-3537.
- Chan JW, Goodwin PH (1995) Extraction of genomic DNA from extracellular polysaccharide-synthesizing Gram-negative bacteria. *Journal of Bio Techniques* 18:418-422.
- Coskuner G, Ballinger SJ, Davenport RJ, Pickering RL, Solera R, Head IM, Curtis TP (2005) Agreement between theory and measurement in quantification of ammonia-oxidizing bacteria. *Journal of Applied Microbiology and Biotechnology* 71:6325-6334.
- Cowan DA (2000) Microbial genomes-the untapped resource. *Journal of Trends Biotechnology* 18:14-16.
- Creighton TE, Shortle D (1994) Electrophoretic characterization of the denatured states of staphylococcal nuclease. *Molecular Biology Journal* 242 (5): 670-682.
- Curtis TP, Sloan WT (2004) Prokaryotic diversity and its limits: microbial community structure in nature and implications for microbial ecology. *Current Opinion In Microbiology* 7:221-226.
- Diez B, Pedros-Alio C, Marsh L, Massana R (2001) Application of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) to study the diversity of marine picoplanktonic assemblages and comparison of DGGE with other molecular techniques. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 67:2942-2951.
- Dinoto A, Marques TM, Sakamoto K, Fukuya S, Watanabe J, Ito S, Yokota A (2006) Population dynamics of *Bifidobacterium* species in human feces during raffinose administration monitored by fluorescence in situ hybridization-flow cytometry. *Journal of Applied Microbiology and Biotechnology* 72:7739-7747.

چاهک وروودی (این مورد برای تمام سیستم های DGGE است)، بروز خوردگی در الکتروودها.

سیستم INGENY نسبت به سیستم Bio-Rad دارای مزایای بسیاری است، اما دارای معایب نیز می باشد. این مزایا و معایب عبارتند از: عدم نیاز به حذف عنصر حرارت از مخزن بافر (این امر اجزا می دهد در تمیز کردن و بارگیری ژل حرارت داشته باشیم)، عدم نیاز به ریختن موم در پایین ژل بهدلیل وجود فرم U شکل، حجم بسیار زیاد بافر (۱۷ لیتر) که احتمالاً به ثبات درجه حرارت کمک می کند، اما تا حدودی از لحاظ آماده سازی بافر ایجاد اختلال می کند، ژل وسیع دارای گنجایش ۳۲ چاهک (متداول) و ۴۸ چاهک (کم عرض) می باشد، شبیب سیستم زیاد شده است. در سیستم CBS حجم بافر ۱۸ لیتر است و می تواند ۴ ژل را نگه دارد که این موضوع می تواند در مدیریت زمان موثر باشد.(Ercolini 2004).

## نتیجه گیری

بر اساس مباحث مطرح شده در این بررسی می توان نتیجه گیری نمود که روش DGGE می تواند در بررسی جوامع و تنوع میکروبی موجود در نمونه های مختلف، تشخیص بیماری های میکروبی و شناسایی باکتری ها در مقیاس بزرگ استفاده شود، زیرا این روش قابلیت اجرای نسبتا ساده دارد. با در نظر گرفتن محدودیت های فعلی، DGGE روشی کارآمد و منحصر به فرد است که پل ارتباطی بسیاری از زمینه های زیست شناسی مولکولی بوده و محدودیت های آن در درجه اول مربوط به این واقعیت است که هنوز روشی نسبتا جدید به شمار می رود. بنابراین تنها پاسخ مناسب به این پیشرفت، داشتن توجه ویژه در بهبود چنین روش های جدیدی خواهد بود.

- Dollhopf SL, Hashsham SA, Tiedje JM (2001) Interpreting 16S rDNA T-RFLP data: Application of self-organizing maps and principal component analysis to describe community dynamics and convergence. *Journal of Microbial Ecology* 42:495 - 505.
- Elizabeth A, Galbraith A, Antonopoulos A, Bryan A (2004) Suppressive subtractive hybridization as a tool for identifying genetic diversity in an environmental metagenome: the rumen as a model. *Journal of Environmental Microbiology* 6:928-37.
- Ercolini D (2004) PCR-DGGE fingerprinting: novel strategies for detection of microbes in food. *Journal of Microbiological Methods* 56:297-314.
- Ferris MJ, Muyzer G, Ward DM, (1996) Denaturing gradient gel electrophoresis profiles of 16S rRNA-defined populations inhabiting a hot spring microbial mat community. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 62:340-346.
- Fischer SG, Lerman LS (1979) Length-independent separation of DNA restriction fragments in two-dimensional gel electrophoresis. *Journal of Cell* 16:191-200.
- Fischer SG, Lerman LS (1980) Separation of random fragments of DNA according to properties of their sequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 77:4420-4424.
- Fischer SG, Lerman LS (1983) DNA fragments differing by single base-pair substitutions are separated in denaturing gradient gels: Correspondence with melting theory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 80:1579-1583.
- Gabor EM, Devries EJ, Janssen DB (2003) Efficient recovery of environmental DNA for expression cloning by indirect extraction methods. *FEMS Microbiology Ecology* 44:153-163.
- Gilbride KA, Lee DY, Beaudette LA (2006) Molecular techniques in wastewater: understanding microbial communities, detecting pathogens, and real-time process control. *Journal of Microbiology Methods* 66:1-20.
- Gomes N, Fagbola O, Costa R, Rumjanek NG, Buchner A, Mendona-Hagler L, Smalla K (2003) Dynamics of fungal communities in bulk and maize rhizosphere soil in the tropics. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 69:3758-3766.
- Green CD, Simons JF, Taillon BE, Lewin DA (2001) Open systems: panoramic views of gene expression. *Journal of Immunol Methods* 250:67-79.
- Henczel T, Friedrich M, Conrad R (1999) Molecular analyses of the methane-oxidizing microbial community in rice field soil by targeting the genes of the 16S rRNA, particulate methane monooxygenase, and methanol dehydrogenase. *Journal of Applied Environment Microbiol* 65:1980-1990.
- Huaide L, Mei L, Baojie W, Keyong J, Shan J, Shujuan S, Lei L (2009) PCR-DGGE analysis of intestinal bacteria and effect of *Bacillus* spp. on intestinal microbial diversity in kurumashrimp (*Marsupenaeus japonicus*). *Chinese Journal of Oceanology and Limnology* 28:808-814.
- Hugenholtz P, Brett MG, Norman RP (1998) Impact of culture-independent studies on the emerging phylogenetic view of bacterial diversity. *Journal of Bacteriology* 180:4765-4774.
- Hugenholtz P, Pace NR (1996) Identifying microbial diversity in the natural environment: a molecular phylogenetic approach. *Journal of Trends Biotechnology* 14:190-197.
- Huges JB, Hellmann JJ, Ricketts TH, Bohannan BJ (2001) Counting the Uncountable: Statistical Approaches to Estimating Microbial Diversity. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 67:4399-4406.
- Kafili T, Razavi SH, Emam Djomeh Z, Naghavi MR, Alvarez-Martin P, Mayo B (2009) Microbial characterization of Iranian traditional Lighvan cheese over manufacturing and ripening via culturing and PCR-DGGE analysis: Identification and typing of dominant lactobacilli. *European Journal of Food Research* 229:83-92.
- Kim D, Brunt J, Austin B (2007) Microbial diversity of intestinal contents and mucus in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Applied Microbiology* 102:1654-1664.
- Liu Y, Whittier RF (1995) Thermal asymmetric interlaced PCR: automatable amplification and sequencing of insert end fragments from pi and yac clones for chromosome walking. *Journal of Genomics* 25:674-681.
- Long LK, Yao Q, Guo J, Yang RH, Huang YH, Zhu HH (2010) Molecular community analysis of arbuscular mycorrhizal fungi associated with five selected plant species from heavy metal polluted soils. *European Journal of Soil Biology* 46:288-294.
- Manefield M, Andrew SW, Robert IG, Mark JB (2002) RNA stable isotope probing, a novel means of linking microbial community function to phylogeny. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 68:5367-5373.
- Megonigal MD, Rappaport EF, Wilson RB, Jones DH, Whitlock JA, Ortega JA, Slater DJ, Nowell PC, Felix CA (2000) Panhandle PCR for cDNA: a rapid method for isolation of MLL fusion transcripts involving unknown partner genes. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 97:9597-9602.
- Mishra RN, Singla-Pareek SL, Nair S, Sopory SK, Reddy MK (2002) Directional genome walking using PCR. *Journal of Biotechniques* 33:830-834.
- Misook Cho GA, Cawthon RM, Budagov T, Katz M, Yang X, Siegel X, Bergman A, Huffman DM, Schechter CB, Wright WE, Shay JW, Barzilai N, Govindaraju DR, Suh Y (2010) Genetic variation in human telomerase is associated with telomere length in Ashkenazi centenarians. *Proceedings of the*

- National Academy of Sciences of the United States of America 26:1710-1717.
- Morris CE, Bardin M, Berge O, Frey-Klett P, Fromin N, Girardin H, Guinebretiere MH, Lebaron P, Thiery JM, Troussellier M (2002) Microbial biodiversity: approaches to experimental design and hypothesis testing in primary scientific literature from 1975 to 1999. *Microbiol Molecular Biology Review* 66:592-616.
- Muyzer G, Smalla K, (1998) Application of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and temperature gradient gel electrophoresis (TGGE) in microbial ecology. *Journal of Genenetic Molecular Microbiology* 73: 127-141.
- Muyzer G, Waal EC, Uitterlinden AG (1993) Profiling of complex microbial populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 59:695-700.
- Myers RM, Maniatis T, Lerman LS (1987) Detection and localization of single base pair changes by denaturing gradient gel electrophoresis. *Journal of Methods in Enzymology* 155:501.
- Myrick KV, Gelbart WM (2002) Universal fast walking for direct and versatile determination of flanking sequence. *Journal of Gene* 284:125-131.
- Niemi RM, Heiskanen I, Wallenius K, Lindstrom K (2001) Extraction and purification of DNA in rhizosphere soil samples for PCR-DGGE analysis of bacterial consortia. *Journal of Microbiology Methods* 45:155-165.
- Ochman H, Ayala FJ, Hartl DL (1993) Use of polymerase chain reaction to amplify segments outside boundaries of known sequences. *Journal of Methods in Enzymology* 218:309-321.
- Omahony El, Shanahan EF, Eamonn E, Quigley MM, Julian E, Marchesi R (2009) A molecular analysis of fecal and mucosal bacterial communities in irritable bowel syndrome. *Journal of Digestive Diseases and Sciences* 55:392-397.
- Osborn M, Moore A, Edward R, Timmis B, Kenneth N (2000) An evaluation of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis for the study of microbial community structure and dynamics. *Journal of Environmental Microbiology* 2:39-50.
- Pontes DS, Lima-Bittencourt CI, Chartone-Souza E, Amaral-Nascimento AM (2007) Molecular approaches: advantages and artifacts in assessing bacterial diversity. *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology* 34:463-473.
- Possemiers S, Verthe K, Uyttendaele S, Verstraete W (2004) PCR-DGGE-based quantification of stability of the microbial community in a simulator of the human intestinal microbial ecosystem. *FEMS Microbiology and Ecology Journal* 49:495-507.
- Radajewski S, Webster G, Reay DS, Morris SA, Ineson P, Nedwell DB, Prosser JI, Murrell JC (2002) Identification of active methylotroph populations in an acidic forest soil by stable-isotope probing. *Journal of Microbiology* 148: 2331-2342.
- Rappe MS, Giovannoni SJ (2003) The uncultured microbial majority. *Annual Review of Microbiology* 57:369-394.
- Roose-Amsaleg CL, Garnier-Sillam E, Har M (2001) Extraction and purification of microbial DNA from soil and sediment samples. *Journal of Applied Soil Ecology* 18: 47-60.
- Schloss PD, Handelsman J (2003) Biotechnological prospects from metagenomics. *Current Opinion in Biotechnology* 14: 303-310.
- Schloss PD, Handelsman J (2005) Introducing DOTUR, a computer program for defining operational taxonomic units and estimating species richness. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 71:1501-1506.
- Schloss PD, Handelsman J (2005) Metagenomics for studying uncultivable microorganisms: cutting the Gordian knot. *Journal of Genome Biology* 6:229.
- Sekiguchi H, Watanabe M, Nakahara T, Xu BH, Uchiyama H (2002) Succession of bacterial community structure alongthe Changjiang River determined by denaturing gradient gel electrophoresis and clone library analysis. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 68:5142-5150.
- Shelwell KJ (2004) Metagenomics: The science of biological diversity. *The Science Creative Quarterly Journal* 6.
- Sloan TW, Scannell JW (2002) Estimating prokaryotic diversity and its limits. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 99:10494-10499.
- Smalla K, Wieland G, Buchner A, Zock A, Parzy J, Kaiser S, Roskot N, Heuer H, Berg G (2001) Bulk and rhizosphere soil bacterial communities studied by denaturing gradient gel electrophoresis: Plant-dependent enrichment and seasonal shifts revealed. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 67:4742-4751.
- Stevenson BS, Eichorst SA, Wertz JT, Schmidt TM (2004) New Strategies for cultivation and detection of previously uncultured microbes. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 70: 4748-4755.
- Tabatabaei M, Zakaria MR, Abdul Rahim R, Abdullah N, Wright A, Shirai Y, Shamsara M, Sakai K, Hassan MA (2010) Comparative study of methods for extraction and purification of environmental DNA from high-strength wastewater sludge. *African Journal of Biotechnology* 9:4926-4937.
- Tabatabaei M, Abdul Rahim R, Abdullah N, Wright ADG, Shirai Y, Sakai K, Sulaimanh A, Hassan MA (2010) Importance of the methanogenic archaea populations in anaerobic wastewater treatments. *Journal of Process Biochemistry* 45:1214-1225.
- Tabatabaei M, Zakaria MR, Abdul Rahim R, Denis G, Wright A, Shirai Y, Abdullah N, Sakai K, Ikeno S, Mori M, Kazunori N, Sulaiman A, Hassan MA (2009) PCR-Based DGGE and FISH Analysis of Methanogens in Anaerobic Closed Digester Tank

- Treating Palm Oil Mill Effluent (POME). *Electronic Journal of Biotechnology* 12.
- Tam K, Yang CH, Matsumoto MR, Crowley DE Sheppard JD (2005) Comparison of PCR-DGGE and selective plating methods for monitoring the dynamics of amixed culture population in synthetic brewery wastewater. *Journal of Biotechnology Progress* 21:712-719.
- Teske A, Wawer C, Muyzer G Ramsing NB (1996) Distribution of sulfate-reducing bacteria in a stratified fjord (Mariager fjord, Denmark) as evaluated by most-probable-number counts and denaturing gradient gel electrophoresis of PCR-amplified ribosomal DNA fragments. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 62:1405-1415.
- Theron J, Cloete TE (2000) Molecular techniques for determining microbial diversity and community structure in natural environments. *Crit Rev Microbiol* 26:37-57.
- Thomsen TR, Nielsen JL, Ramsing NB, Nielsen PH (2004) Micromanipulation and further identification of FISH-labelled microcolonies of a dominant denitrifying bacterium in activated sludge. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 6:470-479.
- Urbach E et al (1999) Immunochemical detection and isolation of DNA from metabolically active bacteria. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 65: 1207-1213.
- Watanabe K, Watanabe K, Kodama Y, Syutsubo K, Harayama S (2000) Molecular characterization of bacterial populations in petroleum-contaminated groundwater discharged from underground crude oil storage cavities. *Journal of Applied and Environmental Microbiology* 66:4803-4809.
- Wintzingerode F, Gobel UB, Stackebrandt E (1997) Determination of microbial diversity in environmental samples: pitfalls of PCR-based rRNA analysis. *FEMS Microbiology Review* 21:213-29.
- Wintzingerode F, Gobel UB, Stackebrandt E (1997) Determination of microbial diversity in environmental samples: pitfalls of PCR-based rRNA analysis. *FEMS Microbiology Review* 21:213-229.
- Xia S, Li J, Wang R, Li J, Zhang Z (2010) Tracking composition and dynamics of nitrification and denitrification microbial community in a biofilm reactor by PCR-DGGE and combining FISH with flow cytometry. *Biochemical Engineering Journal* 49:370-378.
- Zare-Karizi SH, Hosseini-Mazinani SM, Khazaei-Koohpar Z, Seifati SM, Shahsavani-Behboudi B, Akbari MT, Koochmeshgi J (2010) Mutation spectrum of phenylketonuria in Iranian population. *Molecular Genetics and Metabolism* 102:29-32.