

پروتیین‌های شوک حرارتی و نقش آن در تنش‌های محیطی غیر زنده

مهناز مانده*^۱، رضا معالی‌امیری^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تهران

۲- استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Mandehm@ut.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۸۹/۲/۲ - تاریخ پذیرش: ۸۹/۹/۱۶)

چکیده

تنش‌های غیر زنده از عوامل مهم کاهش محصولات زراعی هستند. گیاهان با توجه به اینکه قدرت جا به جایی ندارند، در شرایط تنش، پاسخ‌های متعددی در سطوح مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بروز داده و بدین وسیله ثبات خود را حفظ می‌کنند. پروتیین‌های شوک حرارتی از مهمترین پاسخ‌های گیاه در مواجهه با تنش‌های غیرزنده هستند که علاوه بر ایفای نقش در تاخوردگی، سرهم بندی، مکان یابی و تخریب پروتیین‌ها در فرایندهای طبیعی سلول، تحت شرایط تنش نیز در حمایت از گیاهان سبب حفظ هومئوستازی سلولی می‌شوند. همچنین، پروتیین‌های شوک حرارتی با سایر مکانیسم‌های پاسخ به تنش (مثل اسمولیت‌ها) نیز اثر متقابل دارند. هدف از این مقاله، بررسی نقش پروتیین‌های شوک حرارتی و اجزای آنها در تنش‌های محیطی و تقابل آن با سایر مکانیسم‌های پاسخ به تنش می‌باشد.

مقدمه

تنش‌های غیر زنده عامل مهم کاهش محصول گیاهان زراعی هستند و حتی تا پنجاه درصد، منجر به کاهش عملکرد می‌شوند (۶۳). گیاهان با توجه به اینکه قدرت جابجایی ندارند، در شرایط تنش پاسخ‌های متعددی در سطوح مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بروز داده و بدین وسیله ثبات خود را حفظ می‌کنند (۲۳)، بنابراین شناسایی و درک مسیرهای متفاوت پاسخ به تنش‌ها و اثرات متقابل آنها، در اصلاح محصولات زراعی و بهبود سطح عملکرد، امری بسیار مهم است (۶۳). هر عامل تنش‌زای غیرزنده (و یا زنده) با داشتن مکانیسم خاص خود، سلول‌ها و متابولیسم‌های هدف منحصر به فردی داشته و طبعاً پاسخ خاصی را القا می‌کند اما بطور کلی، اثر اصلی تنش‌های زنده و غیرزنده بر متابولیسم‌های حیاتی گیاه می‌باشد و از آنجا که انجام بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سلول گیاهی مستلزم حضور و اثر مستقیم یا غیر مستقیم پروتیین‌ها است، این تنش‌ها معمولاً با غیر فعال کردن پروتیین‌ها منجر به ایجاد اختلال در مکانیسم‌های درونی گیاه می‌شوند؛ لذا حفظ پروتیین‌ها در کنفورماسیون طبیعی و ممانعت از تجمع پروتیین‌های غیر طبیعی، برای حمایت سلول‌ها و در سطح بالاتر، حفاظت گیاه در برابر تنش، اهمیت بالایی دارد (۱).

واژه‌های کلیدی

پروتیین‌های شوک حرارتی،
تاخوردگی پروتیین،
تنش‌های غیر زنده،
هومئوستازی سلولی گیاهان

دهند و ثانیاً پروتئین‌های بد تاخوردیده بوسیله یک سیستم خاص تجزیه می‌شوند (که در ادامه به تفصیل بیان می‌شوند).

تسریع تاخوردگی صحیح پروتئین‌ها توسط «چاپرون»^۶ ها انجام می‌شود. چاپرون‌ها دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی هستند که در همه موجودات، از باکتری‌ها تا انسان و در تمام اجزای سلولی یافت می‌شوند و با اتصال به انواع پروتئین‌ها، در تاخوردگی آنها نقش حیاتی دارند. دو گروه عمده از این مولکول‌ها عبارتند از: ۱- چاپرون‌های مولکولی^۷ که به پروتئین‌های تانخورده و یا تاخوردیده ناقص متصل شده و از تجمع و تخریب آنها جلوگیری می‌کنند؛ ۲- چاپرونین‌ها^۸ که مستقیماً پروتئین‌ها را بلعیده و تاخوردگی آنها را سهولت می‌بخشند (۱۹، ۲۵، ۳۴، ۴۰).

بطور کلی، بسیاری از چاپرون‌های مولکولی، پروتئین‌های تنشی هستند و بیشتر آنها در قالب پروتئین‌های شوک حرارتی یافت شده‌اند. بنابراین این چاپرون‌های مولکولی، HSP نام‌گذاری می‌شود (۶) و می‌توان آنها را نشانگرهای زیستی^۹ سیستم ایمنی نامید (۶۴). مثلاً در پروکاریوت‌ها، تجمع پروتئین‌های تانخورده در اثر افزایش دما، سیگنال پایه‌ای است که سبب بیان ژن *rpOH* (ژن تنظیم کننده در شرایط شوک حرارتی) می‌گردد. محصول این ژن یکی از انواع فاکتورهای سیگما به نام سیگما^{۳۲} می‌باشد. این فاکتور نیز به نوبه خود سبب بیان ژن‌های شوک حرارتی می‌شود. بنابراین، پاسخ به شوک حرارتی با افزایش دما، توسط افزایش مقدار سیگما^{۳۲} صورت گرفته و با کاهش فعالیت آن نیز این پاسخ کاهش می‌یابد (۱۶).

گروه دیگری از ژن‌های تنظیم کننده شوک حرارتی توسط نوع دیگری از فاکتور سیگما به نام سیگما- ای^{۱۱} کنترل می‌شود. بیان این ژن‌ها در پاسخ به افزایش دما و با تجمع بیشتر پروتئین‌های تانخورده (موجود در فضای پری پلاسمیک و یا غشایی) القا می‌شود اما هنوز اطلاعات گسترده در خصوص فاکتور سیگما- ای و

تنش‌های غیر زنده و تولید پروتئین‌های شوک حرارتی^۱ (HSPs) یکی از مهم ترین تنش‌های غیر زنده، تنش گرمایی است که مثل دیگر تنش‌ها می‌تواند گروهی از مکانیسم‌های دفاعی گیاهان را (همچون تظاهر ژن‌های خاص) تحریک کند. در واقع این نوع پاسخ به تنش‌ها در سطح مولکولی در همه موجودات زنده دیده می‌شود مخصوصاً وقتی که تغییرات محیطی ناگهانی و شدید باشد که این پاسخ در گیاهان به دو طریق مهم صورت می‌گیرد (۳، ۱۹):

۱- تغییرات موقت در بیان ژن و تولید پروتئین‌های اختصاصی؛
۲- اکتساب سطوح بالای تحمل و یا ایجاد سازگاری.
با افزایش دما، بیان گروه جدیدی از ژن‌ها از سری ژن‌های شوک حرارتی^۲ آغاز می‌شود که نقش آنها حمایت از سلول در تنش‌های محیطی، با تولید پروتئین‌های شوک حرارتی است (۶، ۵۹). با این وجود، عوامل تنش‌زا (تا زمانی که سلول بهبود مجدد^۳ یابد) منجر به توقف فوری پروسه‌های متابولیکی مهم مثل همانند سازی DNA، رونویسی، صدور mRNA و ترجمه می‌گردند.

پروتئین‌های سنتز شده در شبکه آندوپلاسمی و جسم گلژی، باید سریعاً شکل صحیح و فعال خود را بدست آورند (که بیش از ۹۵ درصد پروتئین‌ها اینگونه‌اند) وگرنه سلول مجبور به صرف انرژی زیادی در ساخت پروتئین‌های ناکارآمد و تجزیه پروتئین‌هایی که به خوبی شکل سه بعدی خود را بدست نیاورده‌اند و در سلول تجمع یافته‌اند، می‌شود (۵).

افزایش دما (یا وقوع هر عامل تنش‌زای غیر زنده) منجر به تجمع پروتئین‌های تانخورده^۴ یا تاخوردیده ناقص^۵ در فضای سیتوپلاسمی می‌شود. این پروتئین‌ها معمولاً فعالیت بیولوژیکی نداشته و در بعضی حالات ممکن است موجب بیماری شوند. بنابراین رفع این عامل از جمله فعالیت‌های اصلی سلول در مقابله با تنش می‌باشد که با دو مکانیسم مجزا صورت می‌گیرد. اولاً سلول‌ها سیستم‌هایی دارند که احتمال تشکیل پروتئین‌های بد تاخوردیده را کاهش می‌

⁶ Chaperon

⁷ Molecular chaperons

⁸ Chaperonins

⁹ Biomarkers

¹⁰ $\delta 32$ این فاکتور، فاکتور سیگمای تغییر دهنده نیز نامیده می‌شود.

¹¹ δE

¹ Heat Shock Proteins (HSPs)

² Heat Shock Genes

³ Recovery

⁴ Non-native

⁵ Partial folding

این دما نگهداری شدند، HSPهای جدیدی سنتز می‌شد در حالیکه اگر میوه‌های گرما دیده ابتدا به دمای معمولی و سپس به ۲ درجه منتقل می‌شدند، سطح این HSPها کاهش یافته و میوه‌ها تحملشان را به دمای پایین از دست می‌دادند. این بررسی‌ها اثبات کننده وجود ارتباط بین تظاهر HSPها و افزایش تحمل به سرما می‌باشد که در آن HSPها نقشی مهم در حافظت گیاه تحت تنش سرما ایفا می‌کنند (۱۴، ۲۸). بنابراین پروتیین‌های شوک دمایی نه تنها در پاسخ به تنش‌های محیطی کوتاه مدت القا می‌شوند بلکه تولید آنها یک مرحله ضروری در سازگاری گیاهان به تغییرات دمایی نیز می‌باشند. در واقع تولید اولیه چاپرون HSP 110 بوسیله تنش دمایی در گیاه القا می‌شود اما مسیرهای دیگری نیز وجود دارند که درگیر در سازگاری به دماها است. در شرایط تنش سرمایی نیز محققین به تجمع HSPها و چاپرونین‌ها مخصوصاً HSP90، HSP70 و Small HSP ها اشاره کرده‌اند (۲۳)، اگرچه این پروتیین‌ها عموماً در ارتباط با تنش گرمایی مطرح می‌شوند. بیشتر این ژن‌ها که در فرایند سازگاری به سرما درگیر هستند در پاسخ به پروتیین تانخورده^{۱۵} ایجاد می‌شوند. مثلاً GRP78 (پروتیین مرتبط با گلوکز) که چاپرونی از خانواده HSP70 است در پایداری پروتیین‌ها درگیر بوده و در مدت تنش سرمایی تظاهر آن افزایش می‌یابد.

در طی تنش گرما، اجزای عملکردی چاپرون‌های مولکولی که پتانسیل اتصال به پروتیین‌های هدف را دارند بتدریج افزایش می‌یابند. مشخص شده مسیرهای مولکولی که منجر به بیان HSPها می‌شوند ناشی از تغییر دما و مسیرهای انتقال پیام چندگانه^{۱۶} است که با همکاری یکدیگر منجر به فعال شدن فاکتورهای شوک حرارتی^{۱۷} می‌شوند و بیان ژن‌های HSP را از طریق اتصال به اجزای شوک حرارتی^{۱۸} القا می‌کنند (۲۵، ۲۹) بنابراین بعنوان فعال کننده‌های رونویسی HSP محسوب می‌شوند (۲۷). همچنین، بررسی پروتیین‌های خانواده HSP70 در آرآبیدوپسیس نشان می‌دهد که چهار پروتیین از پنج پروتیین سیتوپلاسمی و دو نوع

ژن‌هایی که کنترل می‌کند، وجود ندارد (۳). همچنین شوک‌های دمایی سبب برنامه ریزی مجدد تظاهر ژن در سطح ترجمه HSPها نیز می‌شوند که می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا نمایند. HSPها در شرایط تنش، مسوول تاخوردگی پروتیین‌ها، سرهم بندی^{۱۲}، مکان یابی^{۱۳} و تخریب^{۱۴} آنها در بسیاری از پروسه‌های طبیعی سلولی می‌باشند و با تاخوردگی پروتیین‌ها تحت شرایط تنش، نقشی حیاتی در حمایت از گیاهان تحت تنش‌های محیطی ایفا کرده و سبب حفظ هومئوستازی سلولی شوند (۶۵، ۱). این پاسخ‌ها در اثر برنامه ریزی مجدد تظاهر ژن انجام می‌گیرد که منجر به تغییرات متابولیکی در گیاه می‌شود (۲۳). اولین مرحله در این مسیر، درک و یا احساس تنش است و پس از آن روشن شدن مسیرهای انتقال سیگنال‌ها است که تولید پروتیین‌ها یا ترکیبات خاصی را به دنبال دارد که هومئوستازی را به حالت اول برمی‌گردانند و یا وضعیت جدید هومئوستازی در گیاه ایجاد می‌کند (۵۰).

مطالعه تظاهر ژن نشان می‌دهد که سازگاری بهتر هنگامی در گیاهان ایجاد می‌شود که دماها بتدریج تغییر کنند بدون اینکه پارامترها تغییرات ناگهانی داشته باشند (۳۸، ۶۱). اگر شرایط دمایی محیط بتدریج تغییر کند، گیاهان قادر به تحمل دامنه‌ای از تغییرات دمایی می‌باشند. به طور مثال افزایش تدریجی دما تا ۳۸ درجه به گیاه اجازه سازگاری و تحمل سطوح بالا را می‌دهد و نگهداری گیاهان در ۱۵ درجه، آنها را به دمای پایینی که طبیعتاً صدمات ناشی از سرما را سبب می‌شود، سازگار می‌کند (۲۸). محققان نشان داده‌اند که گوجه فرنگی‌های رسیده و سبزی که در دمای ۳۸ درجه نگهداری می‌شوند، می‌توانند تا چند هفته به دمای ۲ درجه منتقل شوند بدون اینکه آثاری از صدمات سرمایی در آنها دیده شود در حالیکه میوه‌هایی که گرما ندیده و مستقیم به دمای ۲ درجه منتقل شدند، نشانه‌هایی از آسیب سرمایی را بروز می‌دهند. نتایج مشابهی نیز در مورد سایر بافت‌های گیاه مثل کوتیلدون، هیپوکوتیل و دانه بدست آمده است (۲۸، ۲۹). محققان دریافته‌اند که در میوه‌های گرما دیده که به ۲ درجه منتقل شده و سه هفته در

¹⁵ Unfolded protein response

¹⁶ Multiple signal transduction

¹⁷ Heat shock factors (HSFs)

¹⁸ Heat shock elements

¹² Assembly

¹³ Translocation

¹⁴ Degradation

HSPها و HSFها اجزای مهم شبکه تنظیمی شوک حرارتی هستند و ۴، ۱، ۱ و ۲۵ ژن *HSF* به ترتیب در مخمر، مگس سرکه و مهره داران و برنج یافت شده که ۸ ژن از این ۲۵ ژن به حداقل یک تنش، ۷ ژن به تنش خشکی، ۵ ژن به شوری، ۳ ژن به گرما و یکی به سرما پاسخ روشنی می‌دهند. از بین آن ۸ ژن نیز، *HSFa6b* و *HSF C2a* با تنش گرما، خشکی و شوری القا شدند در حالیکه *HSF C1b* به سرما، خشکی و شوری پاسخ می‌دهند (۲۹). جالب توجه است که الگوی پاسخ خانواده‌های ژنی *HSP* و *HSF* تحت تیمار خشکی و شوری با یکدیگر مشابه است و این امر نشان دهنده وجود شبکه پاسخ مشابهی بین تنش خشکی و شوری در جوانه زنی برنج می‌باشد (۲۹).

چاپرون‌های *HSP70* که از نظر ساختمانی شامل یک دمن *ATPase* در انتهای آمینی به شدت حفظ شده (با وزن مولکولی ۴۴ kDa) و یک دمن متصل به پپتید انتهای کربوکسیلی هستند، با حدود پنجاه درصد تشابه در زیر واحدها در همولوگ *E. coli* و *HSP70* یوکاریوتی، بعنوان حفظ شده‌ترین پروتئین‌های شوک حرارتی یافت شده‌اند (۳۳). موفقیت چرخه اتصال به سوبسترا و آزاد شدن آن با فعالیت ابتدایی *ATPase* و چاپرون‌های همکار *HSP40* - *Dnaj* و *GrpE* مرتبط می‌باشد (۳۳، ۱). این اعضا اغلب در کمک به تاخوردگی سنتز پلی پپتید در مسیر دنوو^{۲۰} و مکان یابی پروتئین‌های پیش ساز^{۲۱} درگیرند. اعضای دیگر فقط وقتی بیان می‌شوند که موجود در جدال با تنش‌های محیطی است. بنابراین آنها بیشتر در تسهیل تاخوردگی مجدد و هضم پروتئولیتیکی پروتئین‌های تغییر نیافته درگیر هستند. علاوه بر این بعضی از اعضای *HSP70* در کنترل فعالیت بیولوژیکی پروتئین‌های تا خورده منظم درگیرند و ممکن است بعنوان بازدارنده منفی، رونویسی «فاکتور *HSP*» (*HSF*) را میانجی‌گری کنند (۳۴). چاپرون‌های *HSP70* نقش بزرگی در تنظیم بیان بسیاری از ژن‌های پایین دست در مسیرهای انتقال در شرایط نرمال و جهش دارند (۱). ژنوم آرآبیدوپیس شامل حداقل ۱۸ ژن کد کننده اعضای خانواده *HSP70* بوده که ۱۴ مورد آن متعلق به زیر خانواده *Dnak*

میتوکندریایی در پاسخ به سرما افزایش بیان دارد (۲۳). Renault و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که در هلو بیان دو پروتئین شبیه به *HSP70* در پاسخ به دمای پایین و بیان دو عضو دیگر خانواده *HSP70* شبیه به *HSP70* کلروپلاست آرآبیدوپیس در دمای ۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. بنابراین پروتئین‌های شوک حرارتی بنظر در تسهیل تاخوردگی در تنش سرما همکاری دارند (۴۵، ۶۶).

با انجام مطالعات و بررسی‌ها، در چند گیاه مدل، پنج خانواده بزرگ از چاپرون‌های شوک حرارتی یافت شده که عبارتند از: خانواده *HSP70* (*DnaK*)؛ خانواده *HSP60* (*GroEL*)؛ خانواده *HSP90*؛ خانواده *HSP100/clp* و خانواده *sHSP* (۲۹، ۱). همچنین ۸، ۱۲، ۱۸، ۲۷، ۲۱ ژن به ترتیب برای خانواده‌های *HSF*، *sHSP*، *HSP70*، *HSP90* و *HSP100* در آرآبیدوپیس شناسایی شده است (۳۱).

گروه‌های متفاوت *HSP/Chaperon* در حفاظت سلول با یکدیگر همکاری دارند و نقش‌های تکمیلی و گاهی تداخلی در حمایت از پروتئین‌های تحت تنش ایفا می‌کنند. همکاری گروه‌های متفاوت چاپرون‌ها با استفاده از بیان چاپرون کنترل شونده با پلاسמיד^{۱۹} در موتانت‌های *E. coli* حساس به دما اثبات شده است (۳۲).

فاکتورهای رونویسی شوک دمایی اجزای انتهایی زنجیره انتقال سیگنال محسوب می‌شوند که فعالیت ژن‌های پاسخ دهنده به تنش دمایی و تعدادی از تنش‌های شیمیایی دیگر را وساطت می‌کنند (۲۶). در مقایسه با دیگر یوکاریوت‌ها، خانواده *HSF* گیاهان تنوع بیشتری نشان می‌دهند (۷۰). همچنین علیرغم ویژگی‌های حفاظت شده زیاد، اعضای خانواده *HSF* تنوع زیادی در الگوی تظاهر و عمل در درون خانواده نیز نشان می‌دهند. آنها موتیف‌های اتصال در آغازگرهای ژن‌های القا شده بوسیله گرما و تنش‌های اکسیداتیو در همه یوکاریوت‌ها را شناسایی می‌کنند (۲۱). تصور می‌شود که این فاکتورهای رونویسی با همکاری فاکتورهای رونویسی دیگر تشکیل یک شبکه پیچیده تنظیمی را می‌دهند که برای حیات و توسعه گیاه در شرایط محیطی تنش‌زا ضروری می‌باشد (۲۶، ۶۹، ۲۷).

²⁰ De-novo

²¹ Precursor

¹⁹ Plasmid-controlled chaperon

جدید HSP70 و قابلیت ترجمه mRNA آن تحت تنش، در سلول‌های مقاوم و سلول‌های طبیعی مشابه است. این نشان می‌دهد که بیان این نوع پروتیین شوک حرارتی در سلول‌های مقاوم، توسط مکانیسم‌های رونویسی و پیش از رونویسی محدود می‌شود. احتمال می‌رود که این عمل برای جلوگیری از اثر پتانسیل سمیت سلولی این پروتیین‌ها باشد (۲۴). همچنین مونتر و همکاران^{۲۳} نشان دادند که بیان ژن‌های HSP70 تریکودرما، منجر به افزایش تحمل آرابیدوپسیس به تنش گرما و سایر تنش‌های غیر زنده می‌گردد و در این آزمایش، پس از پیش تیمار گیاهان با گرما، جوانه‌های تراریخته تحمل بیشتری به تنش‌های اسمزی، شوری و تنش اکسیداتیو نشان دادند. همچنین در لاین‌های تراریخته، سطح رونویسی ژن‌های *Na⁺/K⁺ exchange1 (SOS1)* و آسکوربات پراکسیداز (*APX1*) افزایش یافت در حالیکه فاکتورهای شوک حرارتی و ۴ ژن HSP مورد آزمایش در ۳۵۵ گیاه بیان پایینی داشتند. نهایتاً در این بررسی ثابت گردید HSP70 مقاومت به تنش گرما و سایر تنش‌های غیر زنده را القا می‌کند و پروتیین HSP70 فارچی بعنوان تنظیم کننده منفی فعالیت رونویسی HSF در آرابیدوپسیس عمل می‌کنند (۲۵). ایفای نقش در پاسخ دفاعی به تنش‌ها بوسیله پروتیین HSP70 همچنین توسط Duan و همکاران نیز به اثبات رسیده است (۱۰).

چاپرونین‌های خانواده HSP60 نیز به دو زیر خانواده تقسیم بندی می‌شوند: ۱- چاپرونین GroE که در میتوکندری، کلروپلاست و باکتری‌ها و ۲- چاپرونین‌های CCT (شامل پلی پپتید t-complex1)^{۲۴} که در آرکئی باکتری‌ها و در سیتوسل یوکاریوت‌ها یافت شده‌اند (۱). این خانواده که تقریباً بیشتر پروتیین‌های آزاد سلول را تشکیل می‌دهند (۲-۱ درصد کل پروتیین‌های سلول)، یکی از گونه‌های اصلی چاپرون‌های مولکولی‌اند که برای فعالیت‌های خود نیازمند انرژی ATP می‌باشند. نقش اصلی آنها مدیریت تاخوردگی پروتیین‌های تازه سنتز شده و تازه مکان‌یابی شده است اما آنها نقشی کلیدی در شبکه انتقال سیگنال، کنترل چرخه سلولی، تخریب پروتیین و ترافیک پروتیینی^{۲۵} نیز دارند (۱، ۶۷).

و ۴ تا متعلق به زیر خانواده HSP110/SSE می‌باشند و حداقل ۱۲ عضو از اعضای HSP70 در ژنوم اسفناج یافت شده‌اند. بررسی داده‌های بیان ژن‌های HSP70 در اسفناج و آرابیدوپسیس نشان می‌دهد که اعضای چاپرون‌های HSP70 در پاسخ به تنش‌هایی مثل گرما، سرما و خشکی، تنش‌های شیمیایی یا سایر تنش‌ها بیان می‌شوند و بیان مجدد آنها با ایجاد تحمل گرمایی در گیاه ارتباط مستقیم دارد (۳۶، ۳۵). افزایش تعداد ژن‌های HSP70 در لاروهای مگس سرکه منجر به محافظت بیشتر در برابر تنش گرما می‌شود (۲۴). همچنین انکوباسیون آنزیم‌هایی که بطور مصنوعی دناتوره شده‌اند، با HSP70 و HSP90 و HSP104 منجر به احیای فعالیت آنزیمی آنها می‌شود (۳۷).

تجمع پروتیین‌ها (که با ایجاد تنش افزایش می‌یابد) توسط HSP104 منحل می‌شود (۲۴). علاوه بر این، حضور HSP با تعمیر ساختارهای سلولی مثل میکروفیلانمت‌ها و سانترومرها مرتبط است. در نتیجه فرایندهای طبیعی سلولی مثل اسپیلیسینگ^{۲۲} (۳۸) و ترجمه (۳۹) در طی شرایط تنش، توسط HSPها صورت می‌گیرد. در *E. coli* نیز اثر متقابل (DnaK و HSP70) و HSP40 (DnaJ) فعالیت رونویسی فاکتورسیگما ۳۲ را تنظیم می‌کند (۲۴، ۴۰). در بررسی عملکردی HSP70، موتانت‌هایی تهیه شد که ژن مربوطه، این پروتیین را در سلول‌های خود بیان مجدد می‌کرد (۴۱). بیان مجدد این پروتیین در غیاب تنش، منجر کاهش بیان آنها پس از شوک حرارتی گردید (۴۲). مشخص شده که این کاهش بیان از کاهش سریع در رونویسی HSP70 و افزایش تخریب mRNA آن در طی بازگشت به شرایط غیر تنش (و نه در تنش گرما) ناشی می‌شود. بنابراین، با بررسی میزان بیان ترجمه پروتیین‌های شوک حرارتی در سلول‌های مقاوم به گرما و تحت تنش، مشاهده شد که ترجمه آنها در هر دو نوع سلول شبیه به یکدیگر است با این تفاوت که ترجمه این پروتیین‌ها در حین بازگشت به حالت نرمال و غیر تنشی، در سلول‌های مقاوم به گرما سریع‌تر از سلول‌های طبیعی کاهش یافت. علاوه بر این، ثابت mRNA در ژن HSP70 در سلول‌های مقاوم نسبت به سلول‌های طبیعی تحت تنش کاهش بیشتری یافت. بر طبق این نتایج، سنتز

²³ Marta Montero-Barrientos

²⁴ TCP 1

²⁵ Protein trafficking

²² Splicing

افزایش سطح عملکرد HSP90 در مگس سرکه با جهش ژنتیکی یا تیمار با گلدانامایسین³⁰ (بازدارنده HSP90)، سبب تغییرات پیشرفته مورفولوژیکی و غیرعادی می‌شود. این اولین ارتباط عملکرد HSP90 با تغییرات مورفولوژیکی بوده و فرایندی است که اغلب نیازمند اثرات تغییرات ژنتیکی مستقل است (۱). در این عمل، HSP90 بعنوان یک «بافر» برای حفظ عملکرد آن پروتئین-های جهش یافته که در مسیرهای پیام‌رسانی تکامل و ریخت-زایی³¹ دخیل‌اند، عمل می‌کند. اثر بافری HSP90 همچنین به پروتئین‌های کنترل‌کننده مورفولوژیکی و جهش یافته اجازه می‌دهد که در شرایط نرمال فیزیولوژیکی، بیان تنوع‌های ژنتیکی که توسط اثر بافری HSP90 پنهان می‌شود را خاموش یا سرکوب کنند (۶۶، ۱). مشاهده می‌شود که چاپرون‌های HSP90 سایر پروتئین‌های پیام‌رسان را که رشد و تکامل گیاه را کنترل می‌کنند، همراهی می‌کند. بنابراین HSP90 ممکن است ژنتیک بافری³² در آرابیدوپسیس را فراهم کند و در تطابق با شرایط، در این گیاه (مانند مگس سرکه) همکاری کند (۱). سانگ و همکاران³³ (۲۰۰۹) ثابت نمودند که بیان مجدد *AtHSP90* سیتوسلی و اندامکی در آرابیدوپسیس، مقاومت گیاه به تنش اکسیداتیو را القا می‌کند. در بررسی آنها سه ایزوفرم *AtHSP90* در آرابیدوپسیس، در سیتوسل *AtHSP90.2*، در کلروپلاست *AtHSP90.5* و در شبکه آندوپلاسمی *AtHSP90.7* برای مطالعه مکانیسم عملکردی تحت تنش اکسیداتیو بیان مجدد شدند. نتایج نشان داد که بیان مجدد این سه ژن در گیاهان مقاومت به تنش اکسیداتیو را القا می‌کند و هم‌مؤسثتازی مطلوب HSP90 برای پاسخ به تنش سلول یا ایجاد مقاومت در گیاهان ضروری است (۶۶، ۲۱، ۲۶).

چاپرون‌های خانواده HSP100/Clp اعضای خانواده بزرگ AAA ATPase (با یکسری تغییرات بزرگ در اجزای عملکردی) می‌باشند. خانواده HSP100 پروتئین تجمع یافته را حل کرده و آن را در جایی که بتواند با همکاری سیستم HSP70 و احتمالاً توسط اعضای خانواده HSP60 (GroEL- GroES) دوباره تابخورد، آزاد

ویژگی‌های عملکردی این گروه در گیاهان محدود است. آنها در کمک به پروتئین‌های پلاستید مثل روبیسکو نیز اهمیت بالایی دارند. گزارش شده که گونه‌های جهش یافته‌ی *Cpn60 α* (چاپرونین کلروپلاست گیاهی) در کلروپلاست آرابیدوپسیس، در تکامل صحیح جنین گیاهی و جوانه نقص دارند. همچنین نشان داده شده که چاپرونین‌های CCT در تاخوردگی توبولین‌ها و آکتین‌ها³⁶ همکاری دارند (۴۴). علاوه بر این ممکن است در تغییر مورفولوژیکی³⁷ و تطابق با تنش در مگس سرکه و آرابیدوپسیس نیز نقش‌های مهمی ایفا کنند. گزارشات اخیر نشان داده که HSP90 با پروتئوزوم 26s تقابل دارد و نقشی اساسی در تجمع و نگهداری آن دارد (۱).

اعضای این خانواده برای ایفای نقش خود در سلول بعنوان بخشی از یک ماشین مولتی چاپرونی با HSP70 و یک گروه از چاپرون-های همکار شامل ²⁸Hip، ²⁹Hop، P32 و HSP40 (یک همولوگ DnaJ) و... عمل می‌کنند و بدین ترتیب نقشی مهم در مسیرهای انتقال پیام سلول ایفا می‌کنند. وجه تمایز این خانواده از سایر چاپرون‌های مولکولی این است که بیشتر سوبستراهای شناخته شده آن تا به امروز، پروتئین‌های انتقال سیگنالی (مثل گیرنده هورمون استروئید و کینازهای سیگنالی) می‌باشند (۲۹، ۱).

استخراج ژن‌های HSP90 موجود در سیتوسل، شبکه آندوپلاسمی و پلاستیدها از چندین گونه گیاهی ۷۱-۶۳ درصد شباهت آمینواسیدی با HSP90 مخمر و حیوانات نشان داده است (۶۳، ۴۷). اگرچه چاپرون‌های HSP90 بطور دائم بیان می‌شوند اما در بیشتر موجودات (اعم از یوکاریوت و پروکاریوت) بیان آنها در پاسخ به تنش‌ها افزایش می‌یابد. مثلاً بیان HSP90 در گیاهان بطور پیشرفته‌ای تنظیم شده است و به تنش‌هایی از قبیل گرما، سرما، شوری، حضور فلزات سنگین، فیتوهورمون‌ها، انتقال نوری و تاریکی و پاتوزن پاسخ می‌دهد (۴۸، ۱).

³⁰ Geldanamycin

³¹ Morphogenesis

³² Genetic buffering

³³ Hongmiao Song

²⁶ Tubulins & actins

²⁷ Morphological revolution

²⁸ HSP 70 interacting proteins

²⁹ HSP70/90 organizing proteins

چاپرون همکار، نقش منحصر بفرد در ثبات و تجمع پروتیین‌ها دارند (۵۶). در طی تنش حرارتی، برخی از sHSPها یک درصد از کل پروتیین‌های سلول‌های ریشه و برگ را تشکیل می‌دهند (۸) و برخی از آنها در طول مراحل رشد و نمو گیاه نیز بیان شده و در کنترل رونویسی در حین تنش درگیر هستند (۲۸، ۷، ۱).

پروتیین‌های خانواده sHSP به تنهایی قادر به تا دادن پروتیین‌های تانخورده نیستند. آنها ظرفیت بالایی در اتصال به پروتیین‌های طبیعی (احتمالاً با پیوند هیدروفوبی) و ثبات آنها و ممانعت از تجمع پروتیین‌های غیرطبیعی (۴۷، ۵۵) و در نتیجه تسهیل تاخوردگی توالی آنها با چاپرون‌های وابسته به ATP (مثل سیستم Dnak یا ClpB/DnaK) دارند بنابراین، این چاپرون‌ها با کمک یک مکانیسم وابسته به انرژی، در فراوری پروتیین‌ها در سلول‌های پروکاریوت و یوکاریوت همکاری دارند (۶۳، ۵۷). در ژنوم برنج، دو کلاستر ژن‌های sHSP مضاعف شده مربوط به گروه یک سیتوسولی یافت شده (۲۹) که یک دسته آن روی کروموزوم شماره یک و شامل پنج عضو می‌باشد. به نظر می‌رسد که ژن‌های این دسته در جوانه زنی طبیعی بیان بالایی دارند و چهار ژن (از پنج ژن) الگوی بیان مشابهی که بطور اختصاصی با شوک حرارتی القا می‌شود، دارند. دسته دیگر روی کروموزوم شماره سه قرار داشته و شامل چهار عضو است که در پاسخ به شوک حرارتی بیان می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد که دو برابر شدن‌های پشت سر هم^{۳۶} و تکرار شدن قطعات کروموزومی^{۳۷} نقشی مهم در بیان HSP و HSF در برنج ایفا می‌کنند (۲۹). sHSPهای القاء شده با دست ورزی ژنتیکی در گیاهان، منجر به افزایش مقاومت به گرما می‌شوند. *AtHSF1*، *AtHSF3* بطور دائمی در گیاهان آرابیدوپسیس مهندسی شده بیان شدند و ثابت شده که در این گیاهان، تولید پروتیین‌های شوک حرارتی از طریق HSF کنترل می‌شود (۱۰، ۹). بیان دائمی ژن^{۳۸} *AtHSF1-β-glucoronidase* و *AtHSF3* یا *AtHSF3-GUS* (و نه *AtHSF1* یا *AtHSF4*) پاسخ به تنش حرارتی و افزایش پروتیین‌های شوک حرارتی در شرایط نرمال رشدی را کنترل می‌کند، در نتیجه می‌توان مقاومت گرمایی را با تولید

می‌کند (۴۸ و ۴۹). حضور پروتیین‌های HSP100/Clp در بسیاری از گونه‌های گیاهی مانند آرابیدوپسیس، سویا، تنباکو، برنج، ذرت، لوبیا و گندم گزارش شده است. مانند سایر چاپرون‌ها، خانواده HSP100 هم بطور دائم در گیاهان بیان می‌شوند اما بیان آنها بطور پیشرفته‌ای تنظیم شده و با شرایط تنش‌های متفاوت محیطی مثل سرما، گرما، دهیدراسیون، شوری بالا یا از دست رفتن کلروفیل در اثر تاریکی القا می‌شوند (۱). نتایج بررسی HSPها در برنج نشان می‌دهند که HSP101 برنج قادر به جلوگیری از تجمع گرانول‌های پروتیینی بوده و عملکرد HSP104 مخمر را نیز تکمیل می‌کند و از خانواده HSP109 نیز ژن *Os05g44340* با گرما و خشکی القا می‌شود در حالیکه *Os02g32520* با خشکی و شوری القا می‌گردد (۲۹).

پروتیین‌های شوک حرارتی کوچک^{۳۴} (sHSP)

sHSPها که چاپرون‌های مولکولی خانواده HSP با وزن مولکولی پایین (۴۳-۱۲ kDa) بوده و (۶۸) در گیاهان خانواده متنوع‌تری نسبت به سایر HSPها از نظر شباهت توالی، محل سلولی و عملکرد تشکیل می‌دهند (۵۷، ۵۵، ۱). گیاهان sHSPهای چند گانه^{۳۵} را توسط شش خانواده چند ژنی در هسته کد می‌کنند و هر خانواده ژنی، پروتیین‌های موجود در جزء سلولی مشخص (مثلاً میتوکندری، کلروپلاست، سیتوسل، شبکه آندوپلاسمی) را کد می‌کند (۳۱). در آرابیدوپسیس، ۱۳ نوع sHSP متفاوت بر اساس محل درون سلولی و ارتباطات توالی شان گروه بندی می‌شوند (۴۳) و در سلول‌های یوکاریوت و پروکاریوت، این پروتیین‌ها به دامنه وسیعی از تنش‌های محیطی (۶۲) شامل گرما، سرما، خشکی، شوری و تنش اکسیداتیو پاسخ می‌دهند. دیده شده که sHSP میتوکندریایی ذرت (msHSP) سبب بهبود انتقال الکترون در طی تنش شوری، خصوصاً با حفاظت NADH (فعالیت اکسیدوری‌دوکتازی یوبی کوئینون) می‌شوند (در کمپلکس I). اگرچه آنها در حمایت از آنزیم‌های همکار با کمپلکس II ناتوان هستند (۵۷). در *E. coli* نیز *IbpA* و *IbpB* دو مولکول sHSP همولوگ (با ۴۸ درصد شباهت اسید آمینه‌ای) هستند که بصورت

³⁶ Tandem duplication

³⁷ Chromosome segmental duplication

³⁸ GUS

³⁴ Small Heat Shock Proteins

³⁵ Multiple sHSPs

هکاتورن^{۴۱} (۲۰۰۱) نشان دادند که در تنش شوری در گیاهان، انتقال الکترون در کمپلکس ۱ میتوکندری توسط sHSP ها با اثری مشابه آنتی‌اکسیدان آسکوربات، گلوکاتیون، آلفا-توکوفرول و سوپراکساید دسیموتاز و آنزیم‌های کاتالاز محافظت می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که sHSP میتوکندریایی ممکن است پروتیین‌های سلولی را از طریق یک مکانیسم جستجوی ROS حمایت کند. اما هنوز مشخص نیست که آیا بیان ژن‌های sHSP در طی تنش اکسیداتیو با حضور پراکسید هیدروژن (که ممکن است بعنوان یک مولکول سیگنالی عمل کند)، القا می‌شود یا با پروتیین‌های تخریب شده؛ احتمالاً هر دو مکانیسم در گیرند (۲۱، ۵). تشدید بیان *AtHSP 25.3-P* در آرآبیدوپسیس منجر به ایجاد تحمل به تنش‌های ناشی از نور زیاد و گرما (که تنش اکسیداتیو را القا می‌کند) می‌شود (۲۲). بیان sHSP های سیتوسلی (۱۴) و میتوکندریایی (۲۳) ناشی از القای تنش اکسیداتیو پیشنهاد می‌کند که این sHSP ها نیز احتمالاً در ایجاد تحمل به تنش اکسیداتیو همکاری دارند.

تشدید بیان ژن *OsHSP17.7* مقاومت برنج را به گرمای ناشی از پرتو UV-B و خشکی افزایش می‌دهد (۲۹). ساتو و یوکویا^{۴۲} (۲۰۰۸) با افزایش بیان sHSP ها (*SHSP 17.7*) در برنج، گیاهان تراریخته مقاوم به خشکی تولید نمودند، اگرچه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در پتانسیل آب جوانه‌های لاین‌های تراریخته و گیاهان شاهد در انتهای دوره‌ی خشکی یافت نشد، لیکن تنها جوانه‌های تراریخته با بیان بالای سطح این پروتیین، توانستند پس از آبیاری مجدد دوباره رشد خود را از سر گیرند (۴۸). همچنین sHSP Lo18 در شرایط تنش با لیپوزوم‌های غشا تداخل دارد و با تنظیم وضعیت لیپید، منجر به افزایش نظم مولکولی غشای دو لایه در دمای بالا (۳۳/۸°C) می‌شود. بنابراین sHSP Lo18 می‌تواند در یک پاسخ تطابقی نقش داشته و اجازه دهد غشا ثبات خود را طی تنش در سلول‌ها حفظ کند (۳۰).

در بررسی ژن‌ها و عوامل مؤثر در تنش شوری (۲۷) در برگ‌های جو، بیان sHSP گروه یک با اعمال تنش شوری افزایش یافت.

گیاهان تراریخته، ایجاد نمود (۴۵، ۱۳، ۱۰، ۹). از آنجا که یک سری از پروتیین‌های شوک حرارتی شامل sHSP و HSP70، بطور دائم در گیاهان تراریخت بیان می‌شوند، بررسی نقش sHSP در افزایش مقاومت القا شده دشوار است (۵). در سیستم هترولوگ، مقاومت باکتریایی در *E. coli* با تولید پروتیین نوترکیب *CsHSP17.5* افزایش می‌یابد. تشدید بیان این ژن در شاه بلوط، قابلیت زیست باکتریایی تحت تنش گرما و سرما را افزایش می‌دهد و اثرات محافظتی هر دو نوع sHSP به همراه افزایش ثبات پروتیین‌های محلول صورت می‌گیرد (۱۲، ۱۱، ۵). همچنین تشدید بیان *At-HSP17.7 CII* در آرآبیدوپسیس تراریخته، منجر به افزایش سطوح پروتیین و ژن *At-HSP17.7* در شرایط طبیعی گردید (۱۴) و افزایش مقاومت به تنش شوری و خشکی را ایجاد نمود. اندوژن پروتیین‌های *At-HSP17.7 CII* در بذور نیز با اکتساب مقاومت به دهیدراسیون بطور طبیعی افزایش یافت (۱۴). بنابراین احتمالاً *At-HSP17.7 CII* بدنال واسرشت شدن پروتیین‌ها به علت تنش اسمزی در طی بلوغ بذر، بعنوان چاپرون-های مولکولی عمل می‌کنند (۱۴). در مقابل، آلامیلو^{۳۹} (۱۹۹۵) و همکاران گزارش کردند که بیان مجدد sHSP آفتابگردان در توتون منجر به القای مقاومت به تنش نمی‌شود (۱). تنش‌های اسمزی معمولاً با تنش اکسیداتیو ناشی از اثرات عواملی مثل رادیکال‌های فعال اکسیژن^{۴۰} هستند (۱۷). نقش sHSP در مقاومت به تنش اکسیداتیو از طریق مشاهداتی که در آنها sHSP در پاسخ به تیمار نمونه‌ها با پراکسید هیدروژن (H₂O₂) تولید و افزایش یافت، تعیین شد. از آنجا که در شرایط طبیعی و یا تنش، کلروپلاست‌ها محل تجمع sHSP ها می‌باشند (۱۷) بنابراین sHSP های موجود در کلروپلاست در مقاومت به تنش اکسیداتیو ایفای نقش می‌کنند. در سلول‌های پستانداران، sHSP می‌تواند میزان ROS را از طریق مسیرهای وابسته به گلوکاتیون کاهش دهد (۱۹). همچنین HSP27 (sHSP اصلی در سلول‌های پستانداران) که در تنش اکسیداتیو آزاد می‌شود، با همکاری سیتوکروم-سی که از میتوکندری بیان می‌شود، می‌تواند سلول را از مرگ محافظت کند (۲۰). همیلتون و

⁴¹ Hamilton and Heckathorn

⁴² Sato and Yokoya

³⁹ Alamillo


⁴⁰ Reactive oxygen species

ها، مشاهده‌ی اثر متقابل چاپرون‌های خانواده‌های HSP70 و HSP90 و چاپرون‌های همکارشان با تعداد زیادی از مولکول‌های سیگنالی شامل گیرنده‌های هورمون هسته‌ای، کینازهای تیروزین و سرین/ ترئونین و تنظیم‌کننده‌های مرگ سلول و چرخه‌ی سلول نشان می‌دهند که آنها نقشی کلیدی در شبکه‌های انتقال سیگنال ایفا می‌کنند (۵۳). وضعیت احیای مولکول‌هایی شامل تیول‌ها در عملکردهای سلولی مثل سنتز و تاخوردگی پروتیین‌ها، تنظیم فعالیت و ساختار آنزیم‌ها، گیرنده‌ها و فاکتورهای رونویسی مهم هستند. دیده شده که sHSP ها در سلول‌های پستانداران، نه تنها در حمایت تحت شرایط تنش، در عملکردهای دیگر سلولی (مثل تمایز و مرگ) با شرکت در تنظیم وضعیت احیای سلولی نیز درگیرند (۵۴). اگر چه اغلب این مطالعات در موجودات دیگر (نسبت به گیاهان) بیشتر انجام شده، اما مکانیسم‌های تداخل مشابه ممکن است در گیاهان عمل کند. مثلاً در آرابیدوپسیس بیان ژن HSP و پروتیین‌های آنتی‌اکسیدان آسکوربات پروکسیداز به طور همزمان افزایش می‌یابد و این نتیجه پیشنهاد می‌کند که HSP ها ممکن است نه تنها در سنتز HSP بلکه در تنظیم تنش اکسیداتیو بیان ژن آنتی‌اکسیدان نیز درگیر باشند (۵۸). اکتساب تحمل به تنش در گیاهان اغلب نتیجه مکانیسم‌های پاسخ متفاوتی است که ممکن است بصورت هماهنگ یا متضاد (متقابل) عمل کرده و با جلوگیری از آسیب سلولی، بازیابی هومئوستازی را ایجاد کنند. ممکن است بین HSP و سایر مکانیسم‌های پاسخ به تنش در گیاهان اثرات متقابلی وجود داشته باشد. مثلاً HSP ها در انتقال پیام تنش و فعالسازی ژن و همچنین در وضعیت احیای سلولی نقش دارند. همچنین آنها ممکن است با سایر مکانیسم‌های پاسخ به تنش مثل اسمولیت‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها تقابل داشته باشند (۶۳). بنابراین نقش آنها در تنظیم وضعیت احیای سلولی و در مکانیسم‌های دیگر پاسخ به تنش در گیاهان هنوز در حال مطالعه و بررسی است.

نتایج نشان می‌دهد که افزایش در مقدار sHSP ها ممکن است در تعمیر یا کمک به پروتیین‌های دناتوره شده تحت تنش یا ایجاد مجدد کنفورماسیون طبیعی پروتیین‌های سیتوسولی نقش داشته باشد (۲۹).

تداخل پروتیین‌های شوک حرارتی با متابولیت‌های دیگر تنش‌های غیر زنده پاسخ‌های چندگانه شامل تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی ایجاد می‌کنند. ایجاد تحمل به تنش در گیاه اغلب نتیجه‌ی مکانیزم‌های متعدد پاسخ به تنش است که در همکاری با یکدیگر، سلول را از خطرات حفظ کرده و به حفظ هومئوستازی سلولی کمک می‌کنند (۱).

حضور سیستم HSP/Chaperon نقش‌های مهمی هم در شرایط طبیعی و هم به هنگام تنش در سلول‌ها ایفا می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که HSP/Chaperon ها با سایر مکانیزم‌های پاسخ به تنش تقابل دارند بنابراین HSP ها نه تنها بصورت مجزا بررسی می‌شوند بلکه بعنوان یک کمپلکس چند جزئی در ترکیب با سایر عوامل دخیل در پاسخ به تنش‌ها بررسی می‌گردد. به عنوان مثال اسمولیت‌ها گروهی از اجزا با وزن مولکولی پایین هستند که در پاسخ به تنش اسمزی در موجودات افزایش می‌یابند (۵۲) (شکل ۱). بررسی انجام شده در مخمر نشان داد که تری‌هالوز تجمع پروتیین‌های دناتوره را سرکوب کرده و آنها را در یک وضعیت تاخورده‌ی ناقص حفظ کرده تا بتوانند با چاپرون‌های مولکولی دوباره فعال شوند. اسمولیت‌های بررسی شده (گلاسیسین بتائین، گلیسرول، پرولین و تری‌هالوز) در *E. coli* همچنین می‌توانند با افزایش ثبات پروتیین‌های طبیعی و همکاری در تاخوردگی مجدد پلی‌پپتیدهای تانخورده به عنوان چاپرون‌های شیمیایی عمل کنند (۱). پیشنهاد شده که سلول ثبات پروتیین و عدم تجمع پروتیین‌های معیوب و تاخوردگی مجدد آنها را بطور اختصاصی با سطوح متفاوت اسمولیت‌های بین سلولی کنترل می‌کند. بررسی‌ها دیدگاه جدیدی در تداخل بین HSP ها و سایر مکانیزم‌های محافظتی در تنش نشان می‌دهند. علاوه بر اسمولیت-



شکل ۱- اثر متقابل پیشنهاد شده بین شبکه HSP و سایر مکانیسم‌های پاسخ به تنش در گیاهان.

منابع

1. Alamillo J., Almoguera C., Bartels D., Jordano J (1995) Constitutive expression of small heat shock proteins in vegetative tissues of the resurrection plant *Craterostigma plantagineum*. *Plant Mol. Biol.* 29, 1093 – 1099.
2. Arrigo, A.P (1998) Small stress proteins: chaperones that act as regulators of intracellular redox state and programmed cell death. *Biol. Chem.* 379, 19–26.
3. Asada K (1994) Production and action of active oxygen species in photosynthetic tissues. In: Foyer C H, Mullineaux P M. *Causes of Photooxidative Stress and Amelioration of Defense Systems in Plants*. Tokyo : CRC Pres. 77-104.
4. Banzet N., Richaud C., Deveaux Y., Kazmaizer M., Gagnon J., Triantaphylide's C (1998) Accumulation of small heat shock proteins, including mitochondrial HSP22, induced by oxidative stress and adaptive response in tomato cells. *Plant J.* 13(4):519 – 527.
5. Bukau, B. & Horwich, A.L (1998) The Hsp70 and Hsp60 chaperone machines. *Cell* 92, 351–366.
6. Chamnongpol S., Willekens H., Moeder W., Langebartels C., Sandermann Jr. H., Van Montagu M., Inze´ D., Van Camp W (1998) Defense activation and enhanced pathogen tolerance induced by H₂O₂ in transgenic tobacco. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 95, 5818– 5823.
7. Coucheney F, Gal L, Beney L, Lherminier J, Gervais P, Guzzo J (2005) A small HSP, Lo18, interacts with the cell membrane and modulates lipid physical state under heat shock conditions in a lactic acid bacterium - *Biochimica et Biophysica Acta* 1720:92–98
8. Craig, E., & Gross, C. A (1991) Is hsp70 the cellular thermometer? *Trends Biochem. Sci.* 16,135–140.
9. Dat J., Vandenabeele S., Vranova´ E., Van Montagu M., Inze´D, Van Breusegem F (2000) Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. *Cell. Mol. Life Sci.* 57, 779– 795.
10. De Maio, A., Beck, S. C., & Buchman, T. G (1993) Induction of translational thermotolerance in liver of thermally stressed rats. *Eur. J. Biochem.* 218,413–420.
11. Duan Y, Guo J, Ding K, Wang S-J, Zhang H, Dai X-W, Chen Y-Y, Govers F, Huang L-L, Kang Z.S (2010)

Characterization of a Wheat HSP70 gene and its expression in response to stripe rust infection and abiotic stresses. *Mol Biol Rep.* (accepted paper)

12. Ellen, A.A. et al. (2002) Chaperoning signaling pathways: molecular chaperones as stress-sensing 'heat shock' proteins. *J. Cell Sci.* 115, 2809–2816
13. Freeman, B. C., & Morimoto, R. I (1996) The human cytosolic molecular chaperones hsp90, hsp70 (hsc70) and hdj-1 have distinct roles in recognition of a non-native protein and protein refolding. *EMBO J.* 15(12): 2969–2979.
14. Gallie D. R, Caldwell C. & Pitto L (1995) Heat Shock Disrupts Cap and Poly (A) Tail Function during Translation and Increases mRNA Stability of Introduced Reporter mRNA. *Plant Physiology* 108(4) 1703 -1713.
15. Gamer J., Multhaup G., Tomoyasu T., McCarty J. S., Rudiger S., Schonfeld H.-J., Schirra C., Bujard H., & Bukau B (1996) *EMBO J.* 15, 607–617.
16. Lewin B (1997) *Gene VI.* pp: 320-322. Oxf. Uni. Press and Cell press.
17. Giorno F., Wolters-Arts M., Grillo S., Scharf K., Vriezen W.H., Mariani, C (2010) Developmental and heat stress-regulated expression of HsfA2 and small heat shock proteins in tomato anthers. *J. Exp. Bot.* 61,453-462.
18. Goloubinoff, P. et al. (1999) Sequential mechanism of solubilization and refolding of stable protein aggregates by a bichaperone network. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 96, 13732–13737.
19. Gupta SC, Sharma A, Mishra M, Mishra R, Chowdhouri DK (2010) Heat shock proteins in toxicology :How close and How far? *Life Sci.* 86,377-384
20. Gutsche, I. et al. (1999) Group II chaperonins: new TriC(k)s and turns of a protein folding machine. *J. Mol. Biol.* 293, 295–312.
21. Ha'rndahl U. et al. (2001)The chaperone-like activity of a small heat shock protein is lost after sulfoxidation of conserved methionines in a surface-exposed amphipathic α -helix. *Biochimica et Biophysica Acta.* 1545,227-237.
22. Hartl, F.U (1996) Molecular chaperones in cellular protein folding. *Nature.* 381, 571–580.
23. Heidarvand L, Maali Amiri R. (2010) What Happens in Plant Molecular Responses to Cold Stress? *Acta Physiologiae Plantarum*, 32(3): 419-431.
24. Hongmiao S., Pengxiang F., Yinxin L (2009) Over expression of Organellar and Cytosolic AtHSP90 in *Arabidopsis thaliana* Impairs Plant Tolerance to Oxidative Stress. *Plant Mol Biol Rep* 27:342–349.
25. Hu W, Hu G, Han B (2009) Genome-wide survey and expression profiling of heat shock proteins and heat shock factors revealed overlapped and stress specific response under abiotic stresses in rice. *Plant Science* 176,583–590.
26. Koskull-Doring P.v, Scharf K.D & Nover L (2007) The diversity of plant heat stress transcription factors. (Rev).*TRENDS in Plant Science* 12(10):452-457.
27. Kotak S, Larkindale J, Lee Ung, Koskull-Do' ring P.von, Vierling E & Scharf K.D (2007) Complexity of the heat stress response in plants. *Current opinion in plant biology*, 10:310-316.
28. Krishna, P. & Gloor, G (2001) The Hsp90 family of proteins in *Arabidopsis thaliana*. *Cell Stress Chaperones* 6, 238–246.
29. Mittler R,Zilinskas BA(1992)Molecular cloning and characterization of a gene encoding pea cytosolic ascorbate peroxidase. *J. Biol. Chem.*207:21802-7.
30. Lavoie J. N., Gingras-Breton G., Tanguay R. M., & Landry J (1993) Induction of Chinese hamster HSP27 gene expression in mouse cells confers resistance to heat shock. HSP27 stabilization of the microfilament organization. *J. Biol. Chem.* 268, 3420–3429.
31. Lee S.H, Lee K.W, Kim K.Y., et. al. (2009) Identification of salt-stress induced differentially expressed genes in barley leaves using the annealing control-primer-based Gene Fishing technique. *African Journal of Biotechnology*, 8 (7):1326-1331.
32. Lin B.L. et al. (2001) Genomic analysis of the Hsp70 super family in *Arabidopsis thaliana*. *Cell Stress Chaperones* 6, 201–208.
33. Lindquist, S. & Craig, E.A. (1988) The heat-shock proteins. *Annu.Rev. Genet.* 22,631– 67.
34. Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky, & Darnell (2004) *Molecular Cell Biology.* 973 pages.W.H. Freeman and Company.
35. Malik M.K., Slovin J.P., Hwang C.H., Zimmerman J.L (1999) Modified expression of a carrot small heat shock protein gene, Hsp17.7, results in increased or decreased thermo tolerance. *Plant J.* 20(1): 89– 99.
36. Montero-BarrientosM, et.al. (2010)Transgenic expression of the *Trichoderma harzianum* hsp70 gene increases *Arabidopsis* resistance to heat and other abiotic stresses. *J. Plant Physiol*, 167(8): 659-665. doi:10.1016/j.jplph.2009.11.012.
37. Mogk, A. et al. (2003) Small heat shock proteins, ClpB and the DnaK system form a functional triade in reversing protein aggregation. *Mol. Microbiol.* 50, 585–595.
38. Nazari MR, Habibpour Mehraban F, Maali Amiri R, Zeinali Khaneghah H. Preliminary (2010) Evaluation of Response in Desi Chickpea Genotypes for Low Temperature Stress. *Iranian Journal of Field Crop Science*, (under published).
39. Nicolas L. Taylor, Yew-Foon Tan, Richard P. Jacoby, A. Harvey Millar(2009) Abiotic environmental stress induced changes in the *Arabidopsis thaliana* chloroplast, mitochondria and peroxisome proteomes. *Journal of Proteomics.* 72,367–378.
40. Panaretou, B et.al. (2002) Activation of the ATPase Activity of Hsp90 by the Stress-Regulated Cochaperone Aha1. *Mol. Cell.* 10, 1307–1318.
41. Panchuk, I.I. et al. (2002) Heat stress- and heat shock transcription factor-dependent expression and activity of ascorbate peroxidase in *Arabidopsis*. *Plant Physiol.* 129, 838–853.

42. Paul C., Manero F., Gonin S., Kretz-Remy C., Viot S., Arrigo A.P (2002) Hsp27 as a Negative Regulator of Cytochrome c Release. *Mol. Cell. Biol.* 22(3): 816–834.
43. Peres Ben-Zvi, A. & Goloubinoff, P (2001) Mechanisms of disaggregation and refolding of stable protein aggregates by molecular chaperones. *J. Biol. Chem.* 135, 84–93.
44. Prandl R., Hinderhofer K., Eggers-Schumacher G., Schoffl F (1998) HSF3, a new heat shock factor from *Arabidopsis thaliana*, derepresses the heat shock response and confers thermotolerance when overexpressed in transgenic plants. *Mol. Gen. Genet.* 258(3): 269–278.
45. Renaut J, Hausman JF, Bassett C, Artlip T, Cauchie HM, Witters E, Wisniewski M (2008) Quantitative proteomic analysis of short photoperiod and low-temperature responses in bark tissues of peach (*Prunus persica* L. Batsch). *Tree Genet Genomes.* 4, 589–600.
46. Robertson A.L., Heady S.J., Saunders H.M. et al. (2010) small heat-shock proteins interact with a flanking domain to suppress polyglutamine aggregation. *PNAS.* 107 (23): 10424-10429.
47. Sabehat A, Lurie S & Weiss D (1998) Expression of Small Heat-Shock Proteins at Low Temperatures: A Possible Role in Protecting against Chilling Injuries. *Plant Physiol.* 117, 651–658.
48. Sato Y & Yokoya S (2008) Enhanced tolerance to drought stress in transgenic rice plants overexpressing a small heat-shock protein, sHSP17.7. *Plant Cell Rep* 27, 329–334.
49. Scharf, K.D. et al. (2001) The expanding family of *Arabidopsis thaliana* small heat stress proteins & a new family of proteins containing α -crystalline domains (ACD proteins). *Cell Stress Chaperones* 6, 225–237.
50. Shi Y, Mosser D.D & Morimoto R. I. (1998) Molecular chaperones as HSF1-specific transcriptional repressors. *Genes Dev.* 12, 654–666.
51. Shulaev V, Cortes D, Miller G, Mittler R (2008) Metabolomics for plant stress response. *Physiologia plantarum.* 132, 199–208.
52. Singer M.A. & Lindquist S (1998) Multiple effects of trehalose on protein folding in vitro and in vivo. *Mol. Cell.* 1, 639–648.
53. Soto A, Allona I, Collada C, Guevara M A, Casado R, Rodriguez- Cerezo E, Aragoncillo C, Gomez L (1999) Heterologous Expression of a Plant Small Heat-Shock Protein Enhances *Escherichia coli* Viability under Heat and Cold Stress. *Plant Physiol.* 120, 521–528.
54. Song H, Fan P & Yinxin Li (2009) Overexpression of Organellar and Cytosolic AtHSP90 in *Arabidopsis thaliana* Impairs Plant Tolerance to Oxidative Stress. *Plant Mol Biol Rep* 27, 342–349.
55. Stengel F. et al. (2009) Quaternary dynamics and plasticity underlie small heat shock protein chaperone function. *Pnas.* 107 (5): 2007-2012.
56. Stróżecka J, Ratajczak E, et al. (2010) IbpA the small heat shock protein from *Escherichia coli* forms fibrils in the absence of its cochaperone IbpB. *FEBS letters.* 584 (11): 2253-2257.
57. Sun W, Van Montagu M, Verbruggen N (2002) Small heat shock proteins and stress tolerance in plants. *Rev. Biochimica et Biophysica Acta.* 1577, 1–9.
58. Sung D.Y. et al. (2001) Comprehensive expression profile analysis of the *Arabidopsis* Hsp70 gene family. *Plant Physiol.* 126, 789–800.
59. Swindell W.R., Huebner M, Weber A.P (2007) Transcriptional profiling of *Arabidopsis* heat shock proteins and transcription factors reveals extensive overlap between heat and non-heat stress response pathways, *BMC Genomics* 8:125(available from: <http://www.biomedcentral.com/1471-2164/8/125>).
60. hao N.P, Chen L., Nakashima A, Hara S, Umemura K, Takahashi A, Shirasu K, Kawasaki T, Shimamoto K (2007) RAR1 and HSP90 form a complex with Rac/Rop GTPase and function2 in innate-immune responses in rice, *Plant Cell.* 19, 4035–4045.
61. Timperio et al. (2008) Proteomics applied on plant abiotic stresses: Role of Heat shock proteins (HSPs). *Journal of Proteomics.* 71, 391-411.
62. Van Montfort R.L, Basha E, Friedrich K.L, Slingsby C, Vierling E (2001) Crystal structure and assembly of a eukaryotic small heat shock protein. *Nat. Struct. Biol.* 8, 1025–1030. Doi: 10.1038/nsb722.
63. Wang W, Vinocur B, Shoseyov O & Altman A (2004) Role of plant heat-shock proteins and molecular chaperones in the abiotic stress response. *Rev. TRENDS in Plant Science,* 9(5): 244-252.
64. Wieten L, et al. (2010) A novel heat-shock protein coinducer boosts stress protein Hsp70 to activate T cell regulation of inflammation in autoimmune arthritis. *Arthritis & Rheumatism.* 62(4):1026–1035. Wu Y, Cao Z, Klein W.L. & Luo Y (2010) Heat shock treatment reduces beta amyloid toxicity in vivo by diminishing oligomers. *Neurobiology of Aging.* 31(6):1055-1058.
67. Yan SP, Zhang QY, Tang ZC, Su WA, Sun WN (2006) Comparative proteomic analysis provides new insights into chilling stress responses in rice. *Mol Cell Proteomics* 5, 484–496.
68. Young, J.C. et al. (2001) Hsp90: a specialized but essential protein folding Tool. *J. Cell Biol.* 154, 267–273.
69. Zhiping H, Wei L, et al. (2010) Small Heat Shock Proteins: Recent Advances in Neuropathy. *Current Neurovascular Research.* 7(2):155-166(12).
70. Zhu Y, Wang Z, Jing Y, Wang L, Liu X, Liu Y and Deng X (2009) Ectopic over-expression of BhHsf1, a heat shock factor from the resurrection plant *Boea hygrometrica*, leads to increased thermo tolerance and retarded growth in transgenic *Arabidopsis* and tobacco. *Plant Mol. Biol.* 71(4-5): 451-467. DOI: 10.1007/s11103-009-9538-2.
71. B, Ye C, Lü H, Chen X, Chai G, Chen J. & Wang C (2006) Identification and characterization of a novel heat shock transcription factor gene, GmHsfA1, in soybeans (*Glycine max*).