

بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون *Aegilops umbellulata* ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

Genetic diversity of Iranian *Aegilops umbellulata* collection using RAPD marker

فاطمه پروین درآباد^۱، محمد جعفر آقایی^{۲*}، رجب چوگان^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۲- به ترتیب استادیار، دانشیار، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

Parvin Darabad F¹, Jafar Aghaei M^{*2}, Choukan R²

1. Msc Student, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2. Assistant Professor, Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mjaghaei@spii.ir

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۲/۱۱ - تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۲۳)

چکیده

گندم قدیمی ترین و مهمترین گیاه زراعی دنیا و گسترده ترین محصول زراعی در جهان هم از نظر سطح زیر کشت و هم از نظر مصرف می باشد. کاهش تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی مانع افزایش عملکرد متناسب با افزایش تقاضا و مصرف شده است. بر همین اساس معرفی و شناسایی مواد ژنتیکی مناسب جدید از بین توده های بومی و خویشاوندان وحشی گندم ابزاری مناسب در بهبود سازگاری و خصوصیات ارقام در برنامه های به نژادی گندم می باشد. در این پژوهش ۴۵ ژنوتیپ از کلکسیون منتخب *Aegilops umbellulata* موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران که از ۸ استان کشور جمع آوری شده بودند، به منظور شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی، ساختار ژنتیکی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها بر اساس استان های محل جمع آوری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی تنوع ژنتیکی، از نشانگر RAPD و با استفاده از ده آغازگر ۱۰ نوکلئوتیدی استفاده شد. حاصل این بررسی ۹۷ باند بود که ۹۷/۹۴ درصد آنها پلی مورفیک بودند. میانگین تعداد آلل واقعی ۱/۹۷ و متوسط آلل موثر ۱/۵۳ بود. گستره تنوع ژنتیکی بر اساس شاخص نی، از ۰/۱۴ تا ۰/۲۸ در بین جمعیت های استانی بود و تنوع ژنتیکی کل ۰/۳۲ بود. شاخص های تمایز ژنتیکی بیانگر جریان ژنی نسبتاً آزاد در میان جمعیت های این گونه و عدم تمایز شدید جمعیت ها بود. نمونه های جمع آوری شده از آذربایجان از بیشترین تنوع برخوردار بوده و کمترین فاصله ژنتیکی را با سایر نمونه ها داشت. بنابراین آذربایجان به عنوان مرکز تنوع این گونه در ایران پیشنهاد شد.

واژه های کلیدی

تنوع ژنتیکی

شاخص نی

نشانگر RAPD

Aegilops umbellulata
DNA

مقدمه

گندم حاوی مقادیر زیادی مواد غذایی مورد نیاز انسان از قبیل پروتئین، کربوهیدرات، چربی و ویتامین است. ارزش غذایی بالای گندم به ویژه محتوای کربوهیدرات، آن را به مهمترین منبع غذایی انسانها در سراسر جهان تبدیل کرده است. تقاضای جهانی برای گندم همراه با افزایش جمعیت در حال افزایش است و انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای مصرف گندم و محصولات آن تا ۳۲ درصد افزایش یابد (Weigand 2011) در حالی که نیاز به گندم در سال ۲۰۱۰ در حدود ۶۶۶ میلیون تن بوده است، پیش بینی می شود که این مقدار تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۸۰ میلیون تن برسد (Weigand 2011). این افزایش در عملکرد مستلزم توسعه پایه ژنتیکی ارقام جدید برای پتانسیل عملکرد و سازگاری به تنش های زنده و غیرزنده است (Rana et al. 2013). اما دوره های متمادی انجام انتخاب در میان ارقام تجاری و لاین های پیشرفته اصلاحی منجر به باریک شدن بیش از اندازه پایه ژنتیکی این ارقام شده (Shiva 1992) و بنابراین پس از یک دوره پیشرفت سریع در عملکرد ارقام که با معرفی ارقام پایه کوتاه مکزیکی صورت گرفت، افزایش معنی داری در عملکرد و توسعه سازگاری ارقام جدید گندم مشاهده نمی شود. بنابراین تولید غذای بیشتر، برای تغذیه جمعیت در حال رشد، نیازمند توسعه پایه ژنتیکی لاین های اصلاحی و دسترسی به منابع جدید تنوع برای اجزای عملکرد است. این نیاز محققین را وادار می سازد تا منابع جدید تنوع ژنتیکی را در میان توده های بومی و یا گونه های خویشاوند گندم جستجو نمایند (Rana et al. 2013). بیشتر گندم هایی که در سرتاسر جهان کشت می شوند، هگزاپلوئید بوده و متعلق به گندم نان یعنی *Triticum* می باشند (Khodabandeh 1996). تقسیم بندی جنس *Triticum* بر اساس تعداد دسته جات کروموزومی آن انجام شده که دارای سه دسته کروموزوم یا سه ژنوم قابل تشخیص A، B و D می باشد. بر همین اساس فرمول ژنومی سه گروه پلوئیدی گندم های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید به ترتیب AA، AABB، AABBD و AABBD می باشد (Stoskopf 1981). علاوه بر این سه ژنوم، ژنوم های پایه ای U، C و S نیز در میان گونه های وحشی گندمیان یافت می شود که با ژنوم های گندم نان همپولوگ هستند. بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسما پیش نیاز استفاده از منابع جدید

خویشاندان وحشی است. از نشانگر مولکولی RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی و روابط میان جمعیت ها در بسیاری از گونه های گیاهی و از جمله برای بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ارقام گندم نان (Mortazavian et al. 2005)، مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم پلاسما، نمونه هایی از گندم های هگزاپلوئید، تتراپلوئید و دیپلوئیدهای وحشی با ژنوم های (AA) و (DD) (Dashti et al. 2009)، بررسی تنوع ژنتیکی لاین های تربیتی پایروم، تربیتکاله و گندم، گندم دوروم و علف شور ساحل (Siahsar et al. 2010)، همچنین برای ارزیابی تنوع در میان جمعیت های گیاهان کاکوتی *Ziziphora tenuior* (Hatari et al. 2013)، لاله واژگون *Fritillaria imperialis* (Koohgard et al. 2012)، گلرنگ (Rahimi et al. 2011)، نخود زراعی (Fazeli et al. 2011)، برنج (Aghazadeh et al. 2003)، پسته (Hajirezayi et al. 2009)، تیموس *Thymus migricus* (Yavari et al. 2012)، زیره پارسی *Bunium persicum* (Pezhmanmehr et al. 2010)، بنگ دانه *Hyoscyamus niger* (Yousefi et al. 2009)، آگروپیرون (Asghari et al. 2011; Taghizadeh et al. 2011) استفاده شده است و نشان داده که نشانگر RAPD از توانایی بالایی برای تمایز میان جمعیت های یک گونه برخوردار است. (Cenkci et al 2008) روابط میان ۲۲ نمونه از گونه های مختلف جنس گندم و آزیلوپس را با استفاده از ۱۴ نشانگر RAPD مطالعه کردند. آنها نتیجه گرفتند که این نشانگر می تواند برای تمایز میان گونه های گندم و آزیلوپس استفاده شود و از پتانسیل تهیه نشانگرهای اختصاصی ژنوم های گندمیان برخوردار است. گونه *Aegilops umbellulata* Zhuk. یکی از گونه های مهم خویشاوندان وحشی گندم است که بارها برای توسعه ژن های مقاومت به زنگ برگ و زنگ نواری استفاده شده است (Singh et al 2000; Valkoun et al. 1985; Chhuneja et al. 2007, 2008). پتانسیل بالایی از صفات مهم زراعی مانند مقاومت به بیماری ها (Chhuneja et al. 2008)، تحمل به تنش های محیطی (Gorham 1990; Bálint et al. 2002) و کیفیت نانوائی (Castilho et al. 1996; Liu et al. 2002) در ژنوم این گونه گزارش شده است. این گونه گیاهی است یکساله و دیپلوئید ($2n = 2x = 14, UU$) از خانواده گندمیان که از خویشاوندان نزدیک گندم نان به شمار می رود. این گونه در

جدول ۱- لیست آغازگرهای مورد استفاده برای بررسی تنوع ژنتیکی در

کلکسیون *Ae. umbellulata*

نام آغازگر	توالی نوکلئوتیدهای آغازگر (3' → 5')
OPC 13	AAG-CCCT-CGT-<C>
OPC 15	GAC-GGA-TCA-<G>
OPC 11	AAA-GCT-GCG-<G>
OPC 05	GAT-GAC-CGC-<C>
OPC 01	TTC-GAG-CCA-<G>
OPC 09	CTC-ACC-GTC-<C>
OPB 12	CCT-TGA-CGC-<A>
OPY 05	GGC-TGC-GAC-<A>
OPX 01	CTG-GGC-ACG-<A>
OPA 04	AAT-CGG-GCT-<G>

محلول واکنش در حجم ۲۰ میکرولیتر تهیه شد. دمای اتصال آغازگرها با استفاده از گرادیانت دمایی برای هر آغازگر تعیین شد. چرخه حرارتی مورد استفاده شامل یک مرحله واسرشته‌سازی اولیه در دمای ۹۴°C به مدت ۳ دقیقه، مرحله دوم شامل ۳۵ چرخه هر چرخه شامل واسرشته‌سازی در دمای ۹۴°C به مدت یک دقیقه، مرحله اتصال آغازگرها به رشته الگو در دمای ۳۷°C به مدت یک دقیقه، بسط اولیه در دمای ۷۲°C به مدت یک دقیقه و بسط نهایی بعد از اتمام ۳۵ چرخه در دمای ۷۲°C به مدت ۵ دقیقه بود. پس از آن نمونه‌ها تا زمان بارگذاری روی ژل در دمای ۲۰°C نگهداری شدند. فرآورده‌های حاصل از تکثیر جهت تفکیک بر روی ژل آگارز ۰/۸ درصد منتقل شدند و رنگ آمیزی ژل با محلول اتیدیوم بروماید ۰/۵ درصد انجام شد. الگوهای نواری بر اساس حضور (۱) و عدم حضور (صفر) امتیازدهی شدند و ماتریس تشابه بر اساس شاخص Nei (1972) تشکیل شد. شاخص‌های تنوع ژنتیکی درون جمعیتی از قبیل میانگین واقعی آل‌ها که به معنی تعداد آل‌های مشاهده شده یک جایگاه در جمعیت است و میانگین موثر آل‌ها که بیانگر تعداد آل‌هایی است که انتظار می‌رود در هر جایگاه مشاهده شود (Hartl 1997)، شاخص محتوای اطلاعات چند شکلی PIC، شاخص Nei (1973) که معیاری برای نشان دادن هتروزیگوسیتی می‌باشد و شاخص شانون که معیاری برای بیان میزان مشارکت آلی در تفکیک ژنوتیپ‌ها می‌باشد (Shannon 1948)، همچنین شاخص‌های هتروزیگوسیتی Hs، Ht، شاخص‌های همخونی Fis، Fst و Fit، شاخص‌های تمایز زیر جمعیت‌ها GST¹ و جریان ژنی

زمین‌های کم آب، خاک‌های سنگلاخ همراه با بستر سنگی شامل سنگ آهک و یا بالاست می‌روید. بافت‌های خاکی ثبت شده برای این گیاه، خاک رس و شن می‌باشد. نمونه‌های این گیاه تا ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا‌های آزاد، یافت شده‌اند (Chittaranjan 2011). در ایران این گونه بیشتر در اقلیم‌های سرد استپی و مدیترانه‌ای خشک و در ارتفاعات ۶۰۰ تا ۲۲۰۰ متر پراکنش دارند (Totiaei et al. 2007). *Ae. umbellulata* منشأ ژنوم U در میان سایر گونه‌های پلی‌پلوئید گندمیان محسوب می‌شود (Kimber and Feldman 1987). این گونه در غرب و شمال غرب ایران گسترش داشته و ایران یکی از مرکز تنوع آن محسوب می‌شود (Totiaei et al. 2007). تلاش‌هایی برای تهیه آمفی‌پلوئید هگزاپلوئید (AABB^{UU}) نیز با تلاقی میان گونه دیپلوئید *Ae. umbellulata* و گندم دوروم تتراپلوئید (2n=4x=28, AABB) و دو برابر کردن تعداد کروموزوم‌های نتاج آنها انجام شده است (Orlovskaya et al. 2007). Liu et al. (2002) در بررسی زیر واحدهای گلوئین با وزن مولکولی بالا (HMW) در ژنوم U از گونه *Ae. umbellulata* دریافتند که زیرواحدهای گلوئین در این ژنوم بسیار شبیه به زیرواحدهای کد شده ژنوم D هستند. مطالعه حاضر به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و بررسی وضعیت تمایز زیر جمعیت‌ها در کلکسیون گندم وحشی *Ae. umbellulata* ایرانی که در بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداری می‌شود، انجام شده است.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه ۴۵ نمونه ایرانی کلکسیون *Ae. umbellulata* از ۸ استان کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند (جدول ۲). بذور در گلخانه کشت و از برگ‌های جوان برای استخراج DNA استفاده شد. استخراج DNA به روش آزمایشگاه سیمیت انجام شد (Hoisington et al. 1994) و مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت سینازن تهیه شد. پانزده آغازگر ده نوکلئوتیدی برای انجام این آزمایشات تهیه شدند اما ۵ آغازگر چندشکلی در میان توده‌های مورد بررسی نشان ندادند و بنابراین به نتایج ۱۰ آغازگر باقی‌مانده اکتفا شد (جدول ۱).

¹ Genetic diversity statistics

تنوع ژنتیکی نشان نمی‌دهند. با این حال نمونه‌های جمع‌آوری شده از آذربایجان علاوه بر آنکه از تنوع ژنتیکی بالاتری نسبت به نمونه‌های سایر نواحی کشور برخوردار بودند، بیشترین درصد باندهای چندشکل (۸۴/۴۷ درصد)، بیشترین تعداد آل موثر (۱/۴۸) بیشترین اندازه شاخص شانون (۰/۴۴) را نیز در میان نمونه‌های مورد بررسی دارا بودند که بیانگر تنوع بیشتر در نمونه‌های ناحیه آذربایجان نسبت به نمونه‌های جمع‌آوری شده از سایر نقاط کشور می‌باشد. در مقابل شاخص‌های تنوع ژنتیکی در میان نمونه‌های جمع‌آوری شده از استانهای زنجان و لرستان کمتر از سایر نمونه‌ها بود (جدول ۴).

جدول ۲- محل جمع‌آوری نمونه‌های مورد بررسی

محل جمع‌آوری	تعداد نمونه
آذربایجان	۱۱
فارس	۴
همدان	۳
ایلام	۸
کرمانشاه	۷
خوزستان	۶
لرستان	۳
زنجان	۳

جدول ۳- میانگین پارامترهای ژنتیکی بین جمعیتی برای جمعیت‌های مورد

بررسی در گونه *Ae. Umbellulata*

تعداد آل مشاهده شده (na)	تعداد آل موثر (ne)	ضریب تنوع ژنتیکی (h)	شاخص شانون (I)
۱/۹۷۹۴	۱/۵۲۵۷	۰/۳۱۵	۰/۴۷۸۸
۰/۱۴۲۸	۰/۳۱۴۱	۰/۱۴۷۳	۰/۱۸۶۱

Moradkhani et al. 2012 تنوع ژنتیکی بین ۲۰ نمونه از گونه‌های جنس آجیلوپس شامل (*Ae. tauschii*، *Ae. crassa*، *Ae. cylindrica* و *Ae. cpeltoides*) و گندم زراعی (*T. aestivum*) از مناطق مختلف ایران را با استفاده از نشانگرهای SSR مورد بررسی قرار دادند. تنوع ژنتیکی بدست آمده بر اساس شاخص Nei (1973) برای گونه *T. aestivum* (شامل ۵ نمونه جمع‌آوری شده از دو استان اصفهان و کرمانشاه) برابر با ۰/۲، برای گونه *Ae. tauschii* (شامل ۵ نمونه جمع‌آوری شده از مناطق لاهیجان، ارمنستان، ترکمنستان و گرگان) برابر با ۰/۱۵، برای گونه

(Nm^۱) (Nei 1973) محاسبه شدند و در نهایت جمعیت‌ها بر اساس ماتریس فاصله ژنتیکی نی که بر اساس یک معیار شباهت یا یکنواختی ژنتیکی تعریف می‌شوند، گروه‌بندی شدند. این معیار بر مبنای متوسط هموزیگوسیتی جایگاه‌ها در جمعیت‌های مختلف می‌باشد و لگاریتم طبیعی آن پارامتری است که برای ژنوتیپ‌های کاملاً خویشاوند صفر است. تجزیه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 16 و POPGEN 1.31 انجام شد.

نتایج و بحث

در مجموع برای ۱۰ آغازگری که در نمونه‌های مورد بررسی تنوع نشان می‌دادند ۹۷ باند در کل جمعیت مشاهده شد که ۹۵ تا از آنها پلی‌مورفیک بود. میانگین تعداد آل واقعی برای بندها ۱/۹۸ و متوسط تعداد آل موثر ۱/۵۳ بود. برای همه بندها در کل جمعیت مقدار تنوع ژنتیکی کل برابر ۰/۳۱۵ محاسبه شد (جدول ۳) که نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی قابل توجه در کلکسیون *Ae. umbellulata* ایران می‌باشد. (Goryunova et al. (2010 در بررسی تنوع ژنتیکی در گونه *Ae. umbellulata* و سایر گونه‌های آمفی‌پلوئید حامل ژنوم U بیش از ۸۸ درصد پلی‌مورفیسیم برای جایگاه‌های RAPD گزارش کردند. آنها تنوع ژنتیکی کل در گونه *Ae. umbellulata* را کمتر از ۲۰ درصد گزارش کردند. این مقدار برای سایر گونه‌های آمفی‌پلوئید حامل ژنوم U حتی از این مقدار هم کمتر بود. (Gong et al. (2006 برای مطالعه تغییرات تکاملی در ژنوم آزیلوپس‌ها نمونه‌های ۲۳ گونه مختلف آزیلوپس را با استفاده از ۳۱ نشانگر ISSR مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که تغییرات ژنتیکی در ژنوم U نسبت به سایر ژنوم‌ها بسیار کمتر بوده است.

نمونه‌های مورد بررسی از یازده ناحیه مختلف کشور جمع‌آوری شده بودند (جدول ۲) نمونه‌های واقع در هر ناحیه جغرافیایی به عنوان یک زیر جمعیت در نظر گرفته شدند. در میان زیر جمعیت‌ها تنوع ژنتیکی مشاهده شده بر اساس شاخص نی از ۰/۱۴ برای استان لرستان تا ۰/۲۹ برای آذربایجان متفاوت بود (جدول ۴) که نشان می‌دهد زیر جمعیت‌ها تفاوت زیادی از نظر

¹ Gene flow: product of the effective Number of population and proportion of Migrants per generation

جدول ۴- میانگین پارامتری ژنتیکی درون جمعیتی گندم در استانهای محل جمع آوری نمونه

استان های مبدا نمونه‌ها	تعداد آل واقعی (na)	تعداد آل موثر (ne)	تنوع ژنتیکی نی (h)	شاخص شانون (I)
آذربایجان	1/82 ± 0/38	1/48 ± 0/33	0/29 ± 0/17	0/44 ± 0/23
فارس	1/44 ± 0/5	1/34 ± 0/39	0/19 ± 0/22	0/28 ± 0/31
همدان	1/41 ± 0/49	1/34 ± 0/41	0/19 ± 0/22	0/27 ± 0/32
ایلام	1/71 ± 0/46	1/48 ± 0/37	0/28 ± 0/19	0/41 ± 0/28
کرمانشاه	1/61 ± 0/49	1/41 ± 0/36	0/24 ± 0/2	0/36 ± 0/29
خوزستان	1/57 ± 0/5	1/38 ± 0/37	0/22 ± 0/2	0/33 ± 0/3
لرستان	1/32 ± 0/47	1/26 ± 0/39	0/14 ± 0/21	0/2 ± 0/3
زنجان	1/37 ± 0/49	1/34 ± 0/45	0/18 ± 0/23	0/25 ± 0/33

ژنتیکی (Gst) کوچک و معادل 0/3 منجر شده است. با وجود آنکه زیرجمعیت‌ها تفاوت‌های واضحی برای شاخص‌های تنوع ژنتیکی نشان می‌دادند، اما شاخص‌های تمایز ژنتیکی بیانگر وجود تعادل در جمعیت کل و تمایز اندک در میان زیر جمعیت‌ها بودند و بنابراین اگر چه شدت تمایز به حدی نیست که بتوان جمعیت‌های واضحی را در میان نمونه‌های این گونه مشخص کرد اما روند آرام تمایز زیرجمعیت‌ها جریان دارد. منظور کردن نمونه‌های جمع‌آوری شده از استان‌های مختلف به عنوان زیر جمعیت ممکن است معیار دقیقی برای تمایز جمعیت‌ها نباشد و عوامل جدا کننده جمعیت‌ها که می‌توانند مانع تلاقی تصادفی در زیر جمعیت‌ها شوند لزوماً در مرز استان‌ها حضور ندارند. بنابراین هنوز ممکن است تمایزاتی در میان جمعیت‌ها صورت گرفته ولی مورد توجه قرار نگرفته باشند.

جدول ۵- پارامترهای شاخص تمایز ژنتیکی در میان زیر جمعیت‌های *Ae. umbellulata* ایران

Nm*	Gst	Fit	Fst	Fis	میانگین
1/1424	0/3044	-0/05	0/276	-0/515	

بررسی روابط میان جمعیت‌ها با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی (Nei (1972) در میان جمعیت‌ها نشان داد که بیشترین تشابه ژنتیکی بین استان آذربایجان (غربی) و ایلام با ضریب تشابه 0/9289، و کمترین تشابه بین استان خوزستان و زنجان با ضریب تشابه 0/6786 بود. در مجموع نمونه‌های استان زنجان فاصله

Ae. crassa (شامل 4 نمونه جمع‌آوری شده از استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و چهار محال بختیاری) برابر 0/17 و برای گونه *Ae. cylindrica* (شامل 5 نمونه جمع‌آوری شده از آذربایجان شرقی، اردبیل، گرگان، لرستان و زنجان) برابر 0/15 بود. ضریب همخوانی در میان افراد نسبت به جامعه کل (Fit) برابر 0/05- بود (جدول 5). مقدار این آماره بین 1- تا یک تغییر کرده و بیانگر وجود تلاقی غیر تصادفی در جامعه است که شرط اصلی برای تعادل ژنتیکی (Wright 1969) در جامعه می‌باشد. کوچک بودن Fit نشان می‌دهد که شرایط درون جامعه برای تمایز آن به زیر جمعیت‌ها مساعد نیست. ضریب همخوانی در میان افراد نسبت به زیر جمعیت (Fis) برابر 0/515- بود. این شاخص نیز بین 1- تا یک بوده و بیانگر کاهش در نسبت هتروزیگوسیتی افراد در اثر تلاقی غیر تصادفی در درون زیر جمعیت‌ها است. مقدار به نسبت بزرگ قدر مطلق این ضریب نشان می‌دهد که دلیلی برای کاهش نسبت هتروزیگوسیتی مشاهده شده نسبت به هتروزیگوسیتی مورد انتظار که ممکن است در اثر عدم وجود تلاقی تصادفی و تمایز زیر جمعیت‌ها بروز نماید وجود ندارد. ضریب همخوانی در میان زیرجمعیت‌ها نسبت به جامعه کل (Fst) برابر 0/276 بود. مقدار این آماره بین صفر تا یک تغییر کرده و بیانگر تمایز ژنتیکی در میان زیر جمعیت‌ها است. این مقدار به نسبت کوچک Fst ناشی از وجود ضریب جریان ژنتیکی (1/14) = Nm بزرگی در میان زیر جمعیت‌ها است که به یک ضریب تمایز

ایران گزارش کرده است. (1994) Van Slageren پراکنش این گونه را در ترکیه، نواحی شرقی هلال حاصلخیز، قفقاز در آسیای میانه و غرب ایران گزارش کرده است. (2007) Totiaei et al. نمونه‌های این گونه را در غرب ایران از شمال آذربایجان تا جنوب غربی ایران در استان خوزستان جمع‌آوری کرده‌اند. بنابراین دور از انتظار نیست که نمونه‌های جمع‌آوری شده از آذربایجان به مرکز تنوع این گونه نزدیکتر و از سایر جمعیت‌های جمع‌آوری شده این گونه متنوع‌تر باشند.

به طور کلی نتایج بیانگر وجود تنوع ژنتیکی زیاد در نمونه‌های ایرانی گونه *Ae. umbellulata* بوده و نشان می‌دهد که نمونه‌های موجود در کلکسیون به جمعیت‌هایی اصیل و منحصر به فرد تعلق دارند. با توجه به پتانسیل بالایی که برای صفات مهم زراعی مانند مقاومت به بیماری‌ها، تحمل به تنش‌های محیطی و کیفیت نانوائی در ژنوم این گونه گزارش شده است، بررسی بیشتر و دقیق‌تر این کلکسیون می‌تواند پتانسیل آن را در خصوصیات مهم زراعی و سازگاری به محیط‌های مختلف برای کاربرد در برنامه‌های اصلاحی گندم آشکار سازد.


سپاسگزاری

نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و بانک ژن گیاهی ملی ایران که امکانات اجرایی این تحقیق را فراهم کردند تشکر و قدردانی نمایند.

منابع

- Aghazade Gholaki R, Ghareiazai B, Nematzadeh GH A, Babaeian NA (2003) Classification of some Iranian Rice germplasm by Use of RAPD Marker. Iranian Journal of Agricultural Science 34: 757-767 (In Farsi).
- Asghari A, Jafari AA, Shokrpour M, Mohammaddouste Chamanabad HR (2011) Genetic variation between and within populations of *Agropyron gaertn* using RAPD markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 18: 143-153 (In Farsi).
- Bálint AF, Kovács G, Sutka J (2002) Copper tolerance of *Aegilops*, *Triticum*, *Secale* and triticales seedlings and copper and iron content in their shoots. Acta Biologica Szegediensis 46:77-78.
- Castilho A, Miller TE, Heslop-Harrison JS (1996) Physical mapping of sub-centromeric and intercalary translocation breakpoints in a set of wheat-*Aegilops umbellulata* lines using in situ hybridization. Theoretical and Applied Genetics 93:816-825.

بیشتری از سایر نمونه‌های مورد بررسی را نشان می‌دادند. Kaya et al. 2012 در مطالعه‌ی تنوع ژنتیکی و رابطه بین نمونه‌های آجیلوپس از گونه‌های *Ae. cylindrica*، *Ae. triuncialis*، *Ae. umbellulata* و *Ae. geniculata* که از کشور ترکیه جمع‌آوری شده بودند، مشاهده کردند که شباهت ژنتیکی در میان نمونه‌های گونه *Ae. umbellulata* بین ۰/۸ تا ۰/۹۵ بود. از شاخص فاصله (Nei (1972) و روش مقیاس‌بندی چند بعدی برای بررسی موقعیت زیر جمعیت‌ها نسبت به یکدیگر استفاده شد (شکل ۱).



شکل ۱- پراکنش زیرجمعیت‌های گونه *Ae. umbellulata* ایران بر اساس شاخص فاصله نی، با استفاده از روش مقیاس‌بندی چند بعدی

بر اساس این نتایج نمونه‌های جمع‌آوری شده آذربایجان با قرار گرفتن در مرکز پراکنش، در مجموع کمترین فاصله را از سایر زیر جمعیت‌ها دارا بوده و فواصل میان سایر زیر جمعیت‌ها بیشتر از فاصله آنها از نمونه‌های آذربایجان است. نمونه‌های استان زنجان بیشترین فاصله را از سایر زیرجمعیت‌ها دارا بودند. بنابراین با توجه به بالاتر بودن تنوع در نمونه‌های جمع‌آوری شده از آذربایجان تصور می‌شود که مرکز تنوع این گونه در ایران نواحی آذربایجان بوده و سایر زیر جمعیت‌ها از این جمعیت اصلی مشتق شده‌اند. اگرچه همانطور که قبلاً ذکر شد روند تمایز زیر جمعیت‌ها در این گونه بسیار بطئی بوده و فواصل زیادی در میان زیر جمعیت‌ها مشاهده نمی‌شود. (1983) Witcombe مرکز پراکنش نمونه‌های این گونه را در یونان، سوریه، ترکیه، قفقاز و

- Cenkci S, Tildiz M, Konuk M, Eren Y (2008) RAPD analyses of some wild Triticum and Aegilops species and wheat cultivars in turkey. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50:35-42.
- Chhuneja P, Kaur S, Goel R, Aghae-Sarbarzeh M, Dhaliwal HS (2007) Introgression of leaf rust and stripe rust resistance genes from *aegilops umbellulata* to hexaploid wheat through induced homoeologous pairing. In: Buck HT et al. (Ed.) Wheat Production in Stressed Environments, Springer 83-90.
- Chhuneja P, Kaur S, Goel R, Aghae-Sarbarzeh M, Prashar M, Dhaliwal HS (2008) Transfer of leaf rust and stripe rust resistance from Aegilops umbellulata Zhuk to bread wheat (*Triticum aestivum* L.). Genetic Resources and Crop Evolution 55:849-859.
- Chittaranjan K (2011) Wild crop relatives: genomic and breeding resources. Springer, New York.
- Dashti H, Naghavi M, Shahnejat Bushehry AA, Shirani H (2009) Genetic diversity in wheat germplasm using RAPD markers. Modern Genetics Journal 4:55-62 (In Farsi).
- Fazeli F, Chafgamirza k (2011) Genetic variation in iranian chickpea (*Cicer arietinum* L. Kabuli type) based on agronomic traits and RAPD marker. Journal of Seed and Plant Improvement 27:555-579 (In Farsi).
- Gong HY, Liu AH, Wang JB (2006) Genomic evolutionary changes in Aegilops allopolyploids revealed by ISSR markers. Acta Phytotaxonomica Sinica 44:286-295.
- Gorham J (1990) Salt tolerance in the triticeae: K/Na Discrimination in Aegilops species. Journal of Experimental Botany 41:615-621.
- Goryunova SV, Chikida NN, Kochieva EZ (2010) RAPD analysis of the intraspecific and interspecific variation and phylogenetic relationships of Aegilops L. species with the U genome. Russian Journal of Genetics 46:841-854.
- Hajirezayi M, Baghizadeh A, Javadi GH, Sadeghizadeh M (2009) Genetic diversity assessment of a few numbers of pistachio cultivars in Kerman province based on RAPD markers. Iranian Journal of Biology 22:462-469 (In Farsi).
- Hartl DL, Clark AG (1997) Principles of population genetics. Sinauer associates, Sunderland.
- Hatari Z, Zamani Z, Nazeri V, Tabrizi L (2013) Evaluation of genetic diversity in the medicinal plant Kakooti (*Ziziphora tenuior* L.) using morphological characteristics and RAPD markers. Modern Genetics Journal 8:19-28 (In Farsi).
- Hoisington D, Khairallah M, Gonzalez-de-Leon D (1994) Laboratory protocols: CIMMYT applied molecular genetics laboratory, 2nd Ed. D.F. CIMMYT, Mexico.
- Kaya I, Asude CK, Figen YE, Sahin D, Mahinur SA (2011) Genetic diversity and relationship analysis among accessions of Aegilops ssp. in Turkey using amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers. African Journal of Biotechnology 10:16167-16174.
- Kimber G, Feldman M (1987) Wild wheat: an introduction, special report. College of Agriculture. University of Missouri. Columbia USA 353.
- Khodabandeh N (1996) Grain. University of Tehran press, Tehran, Iran. (In Farsi)
- Koohgard M, Shiran B, Mirakhorli N (2012) Study of genetic diversity between and within populations of Fritillaria imperialis in Zagrose regions using RAPD marker. Modern Genetics Journal 7:353-362. (In Farsi).
- Liu ZJ, Zhang XM, Wan YF, Liu KF, Wang DW (2002) Characteristics of high-molecular-weight glutenin subunits and their coding genes from *Aegilops umbellulata*. Acta Botanica Sinica 44:809-814.
- Moradkhani, H, Aboughadareh AP, Mehrabi AA, Etmian AR (2012) Evaluation of genetic relationships of Triticum-Aegilops species possessing D genome in different ploidy levels using microsatellites. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 4:1746-1751.
- Mortazavian SMM, Ramshini H, Naghavi M (2005) Classification of bread wheat cultivars using morphologic data and RAPD markers. 4th Iranian national conference of biotechnology, Tehran, Iran.
- Naghavi MR, Aghaei MJ, Taleei AR, Omidi M, Mozafari J, Hassani ME (2009) Genetic diversity of the D-genome in *T. aestivum* and Aegilops species using SSR markers. Genetic Resources and Crop Evolution 56: 499-506.
- Nei M (1972) Genetic distance between populations. American Naturalist 41: 283-292.
- Nei M (1973) Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 70: 3321-3323.
- Orlovskaya OA, Kaminskaya LN, Khotyleva LV (2007) Introgression of Aegilops genetic material into the genome of hexaploid tritcale. Russian Journal of Genetics 43:281-286.
- Pezhmanmehr M, Hassani ME, Fakhre Tabatabaie M, Hadian J (2010) Evaluation of genetic diversity and differentiation of some bunium persicum (Boiss) populations using RAPD markers. Environmental Sciences 7:63-76. (In Farsi).
- Rahimi M, Marashi H, Farsi M, Ghorbanzadeh M, Rahimi M (2011) Detection of DNA polymorphism of safflower by using of RAPD markers. Journal of Agricultural knowledge and Sustainable Production 21:13-22. (In Farsi).
- Rana RM, Bilal M, Rehman SU, Iqbal F, Nawaz Shah MK (2013) Synthetic wheat; a new hope for the hungry world. Asian Journal of Agriculture and Biology 1:91-94.
- Shiva V (1992) The violence of green revolution: Third world agriculture, ecology and politics. Zed Books.
- Siahsar B, Alahdo M, Shahsavand Hassani H (2010) Evaluation of genetic diversity in Tritipyrom, Triticale and Wheat lines, using RAPD and ISJ markers. Iranian Journal of Agricultural science 41:555-568 (In Farsi).
- Stoskopf NC (1981) Understanding crop production. Reston publishing company, Inc.
- Taghizadeh R, Jafari AA, Imani AA, Asghari A Choukan R (2011) Investigation of genetic variability in Iranian populations of desert wheat grass (*Agropyron desertorum*) based on morphological and RAPD markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 19:85-100 (In Farsi).
- Totiaei AH, Jaffaraghaei M (2007) Collection, Identification and distribution of Aegilops species in Iran.

Iranian Journal of Agricultural science 38:99-109 (In Farsi).

Van Slageren MW (1994) Wild wheats: a monograph of *Aegilops* L. and *Amblyopyrum* (Jaub and Spach) Eig (Poaceae). Agricultural University, Wageningen-ICARDA, Aleppo, Syria, 512 pp.

Weigand C (2011) Wheat import projections towards 2050. US Wheat Associates, USA.

Witcombe JR (1983) A guide to the species of *Aegilops* L. their taxonomy, morphology and distribution. Rome: IBPGR Secretariat.

Wright S (1969) Evolution and the genetics of populations: The theory of gene frequencies. University of Chicago Press.

Yavari AR, Nazeri V, Sefidkon F, Zamani Z, Hassani ME (2012) Evaluation of genetic diversity among and within some endemic populations of *Thymus migricus* Klokov & Desj.-Shost using RAPD molecular markers. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 28:35-47 (In Farsi).

Yousefi MJ, Hassani ME, Arefi HM, Mohammadipour M (2009) Evaluation of genetic diversity of several accessions of Iranian *Hyoscyamus niger* L. based on RAPD markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 17:1-14 (In Farsi).

Zhang H, Jia J, Gale MD, Devos KM (1998) Relationships between the chromosomes of *Aegilops umbellulata* and wheat. Theoretical and Applied Genetics 96:69-75.