

جهش الایی در ژن کننده فعالیت هسته یخ با جهش‌زای EMS در دو جدایه *Pseudomonas viridiflava* از باکتری شبه

Induced mutation in gene controlling ice nucleation activity by EMS, in two strains of *Pseudomonas viridiflava* like bacteria

سیده فاطمه رشیدایی^{۱*}، حشمت‌الله رحیمیان^۱، غلامعلی رنجبر^۱

^۱- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Rashidaei F^{1*}, Rahimian H¹, Ranjbar GH¹

1. MSc Student, Professor, Associate Professor, Mazandaran University, Sari, Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Rashidaei.f@gmail.com

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۴ - تاریخ پذیرش: ۹۳/۹/۱۸)

چکیده

باکتری‌های مولد هسته یخی با افزایش جمعیت و فعالیت خود باعث سرمآذدگی گیاهان در دماهای بالاتر از معمول می‌شوند. اساس ژنتیکی هسته‌های یخی باکتریایی به صورت تک ژن کروموزومی (Ice nucleation active) *ina* می‌باشد. برای ایجاد جهش در ژن *ina* باکتری شبه *Pseudomonas viridiflava* از ماده EMS در دو غلظت ۲۰ و ۲۵ میکرولیتر در میلی‌لیتر استفاده شد. جهت ردیابی ژن *ina* در جدایه‌های شبه *P. viridiflava* از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مرازا با یک جفت آغازگر اختصاصی ژن *ina* که از روی نواحی حفظ شده ژن هسته یخ در چندین گونه باکتری مولد هسته یخی، طراحی شد، استفاده شد. فعالیت هسته یخ با آزمون انجماد قطره‌ای ارزیابی شد. برای بررسی از دست رفتن فعالیت هسته یخی، سوسپانسیون حاوی ۱۰^۷ سلوول در میلی‌لیتر هر جهش‌یافته بر روی گیاهچه‌های پرقال پاشیده شده و از گیاهچه تیمار شده با آب مقطر استریل به عنوان شاهد منفی استفاده شد. گیاهان به مدت ۲ تا ۱۰ ساعت در دمای ۰-۱۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و سپس به گلخانه برگردانده شدند. تعدادی از جهش‌یافته‌های به دست آمده در گیاهچه‌ها ایجاد یخ‌زدگی نکردند.

واژه‌های کلیدی

جهش
هسته یخ
EMS
Pseudomonas viridiflava

سانتی گراد نگهداری شدند. در آزمون انجاماد قطره‌ای از سوسپانسیون قطرات ۱۰ میکرولیتری جدایه‌ها استفاده شد و بر روی ورق آلومینیومی قایق شکل پوشانده شده با لایه نازکی از پارافین و زایلن که قبلاً در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد (به مدت ۱۵ دقیقه) در آون استریل شده بود، قرار داده شد. قایق‌ها در سطح حمام اتالن سرد با دمای ۵-تا ۱۰-درجه سانتی گراد شناور شدند. از آب مقطر استریل به عنوان شاهد منفی استفاده شد. آغازگر از روی نواحی حفظ شده ژن هسته یخ در چندین گونه *Pseudomonas borealis* باکتری مولد هسته یخ، از جمله، *Pseudomonas* و *Pseudomonas syringae* (*inaV gene*) *Pseudomonas syringae S203* و چند جدایه دیگر که برخی از ویژگی آن‌ها در جدول ۱ خلاصه شده، طراحی شد. همترازی توالی‌های نوکلئوتیدی و پروتئینی توسط برنامه Clustal W موجود در نرم‌افزار BioEdit Ver. 7.0.9.0 انجام شد. از روی این همترازی و به صورت دستی آغازگری با عنوان *inaC* و توالی (Forward Primer Premier Ver. 5.0 برای تطابیق داشتن با توالی ژن هسته یخ باکتری‌های مذکور ارزیابی شد. از آغازگر *inaC* برای ردیابی ژن *ina* در دو جدایه ۵۱۰ باکتری *Pseudomonas viriiflava* استفاده شد. در دو جدایه ۱۰۱ و ۱۰۱ با آغازگر *inaC* قطعه‌ای به اندازه ۳۷۰ bp تکثیر شد. جدایه‌های K.B ۱۰۱ و ۵۱۰ باکتری *P. viridiflava* در محیط مایع معادل K_2HPO_4 ۲-۳ گرم پروتئوز پیتون، ۲ گرم تریپتون، ۱ تا ۲ گرم ۰/۵-۱ میلی‌لیتر گلیسیرین، ۰/۵-۱ گرم سولفات منیزیم) کشت داده و در ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد تا باکتری‌ها به مرحله رشد لگاریتمی برسند. پس از ۱۲ تا ۲۴ ساعت، با شروع کدر شدن محلول (مرحله رشد لگاریتمی)، از این سوسپانسیون ۱۰ تا ۲۰ میکرولیتر به یک میلی‌لیتر محیط مایع پایه یا محیط (تریپتون = ۱۰ گرم، عصاره مخمر = ۵ گرم، $NaCl$ = ۵ گرم، ۱ میلی‌لیتر با $v=PH$ منتقل شد. پس از ۴ الی ۶ ساعت که کدری محیط نسبتاً مشخص شد، EMS در دو تیمار ۲۰ و ۲۵ میکرولیتر در میلی‌لیتر به هر کدام اضافه شد. بعد از آن نمونه‌های تیمار شده به مدت ۳۵ دقیقه در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد درون

پدیده هسته یخ‌زایی اولین بار در سال ۱۹۷۴ در جدایه‌های *Pseudomonas syringae* مشاهده شد. کمی بعد از آن مشخص شد که جدایه‌هایی از *Pseudomonas viridiflava*, *Pseudomonas fluorescens*, *Erwinia herbicola* (*Pantoea agglomerans*), *Xantomonas translucens* pv. *translucens* (Maki et al. 1974) بیشتر گونه‌های آب سرد شده را دارند (درجه سانتی گراد بدون یخ زدن، سرد گیاهی می‌توانند تا حدود ۵- درجه سانتی گراد بدون یخ زدن، سرد شوند و گونه‌های گیاهی حساس به یخ‌زدگی در غیاب باکتری‌های Ice^+ دچار خسارت ناشی از تشکیل یخ در دمای بالاتر از ۵- درجه سانتی گراد نمی‌شوند. (Obata et al. 1990) جدایه‌های *Pseudomonas viridiflava* جدا شده از برگ هویج را بر اساس رنگ کلی‌ها به گروه‌های خاکستری، سفید و یا زرد تقسیم کردند. کلینی‌های سفید و زرد فعالیت هسته یخ از خودشان نشان دادند. آن‌ها یک جدایه از این باکتری‌های مولد هسته یخ را مورد مطالعه قرار دادند و اظهار داشتند که ژن هسته یخ در این باکتری‌ها در دمای ۲/۸- درجه سانتی گراد فعال خواهد بود و با استفاده از اوره یا ان-اتیل مالیمید^۱ تولید هسته یخ را در باکتری متوقف کردند. (Lindow et al. 1995) ثابت کردند که با کاهش اندازه جمعیت باکتری‌های اپی‌فیت به کمک موتان‌های Ice^- طبیعی و یا حاصل از موتان‌زایی شیمیایی نژادهای *Pseudomonas* و *Erwinia herbicola*, *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas syringae* صدمات حاصل از سرمآذگی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. جدایه‌های شبه *Pseudomonas viridiflava* از مجموعه جدایه‌های نگهداری شده در آزمایشگاه باکتری‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دریافت شد. برای اطمینان از شناسایی انجام شده، از آزمون لوپات^۲ (Klement et al. 1964) Lelliott et al. (1966) استفاده شد.

برای تعیین فعالیت هسته یخ جدایه‌ها از آزمون انجاماد قطره‌ای^۳ طبق روش Marco and Lindow (1990) استفاده شد. باکتری‌ها روی محیط کشت آگار مغذی سوکروز^۴، با ۱/۵ درصد گلیسیرین کشت و به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای ۲۷ درجه

¹ N-ethylmaleimide² LOPAT³ Droplet freezing method⁴ Nutrient agar + sucrose, NAS

و ایجاد بلاست باشد، اما بعضی دیگر رنگی با تیرگی کمتر قهقهه‌ای روشن تا مایل به زرد داشتند که می‌تواند ناشی از سرمآزادگی برگ‌ها باشد. در ادامه سرمآزادگی تمامی سطح برگ به رنگ قهقهه‌ای روشن یا زرد مایل به قهقهه‌ای در آمد، گیاهچه‌هایی که تا دو هفته پس از تیمار با باکتری‌ها به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از دو هفته علائم سرمآزادگی روی گیاهچه‌های صدمه دیده، شدیدتر شد. گیاهچه‌هایی که با جدایه وحشی تیمار شده بودند بعد از یک هفته علائم سرمآزادگی مشهودی را نشان دادند. گیاهچه‌های تیمار شده با آب مقطر استریل، هیچ علائم را نشان ندادند. (Edwards et al. (1990) و Edwards (1992) و Wolber (1992) نشان دادند که توزیع ژن هسته یخ با انتقال افقي بین جنس و گونه‌های باکتریایی صورت می‌پذیرد. بنابراین می‌توان این احتمال را داد که به مرور زمان این ژن میان جنس و گونه‌های باکتریایی دچار تغییرات جزئی شده است. بنابراین با طراحی جفت آغازگر *INA⁺* (inaC) از نواحی محافظت شده این ژن در چند باکتری Warren et al. (1986) نواحی می‌توان ژن هسته یخ را تکثیر کرد. (Pseudomonas viridiflava) در سه تکرار با نتایج مشابه انجام شد. جدایه‌های ۱۰۱ و ۵۱۰ باکتری شبه *P. viridiflava* به ترتیب در دمای ۶-۱۰ و ۵- درجه سانتی‌گراد دارای فعالیت هسته یخ بودند. این آزمون در سه مرحله رشد لگاریتمی تحت تیمار EMS در دو دوز ۲۰ و ۲۵ میکرولیتر در میلی‌لیتر قرار داده شدند. برای حذف EMS، سلول‌ها شستشو و سلول‌ها در رقت‌های بسیار پایین، رشد داده شدند. گلنهای رشد یافته در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت، برای انتخاب جهش یافته‌های قادر هسته یخ با آزمون PCR با آغازگر *inaC* مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعضی از گلنی‌ها با آغازگر تولید باند کردند که برخی از این باندها مانند باند والدینی و بعضی دیگر متفاوت از باند والدینی بودند. تعدادی از این گلنی‌ها نیز با آغازگر *inaC* نتوانستند باندی تولید کنند که به احتمال قوی نشانگر ایجاد جهش در ژن *ice* این گلنی‌ها بود (شکل ۱). سوسپانسیون کدری از گلنی‌های جهش یافته بر روی گیاهچه‌های چند برگی پرتقال رشد یافته در محیط پایه MS، اسپورپاشی شد و سپس گیاهچه‌ها به مدت ۱۰-۷ ساعت در دمای حدود ۱۰- درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. بعد از این گیاهچه‌ها برای سازگار شدن به محیط گرم ابتدا به یخچال انتقال داده شده و پس از دو روز به محیط گلخانه منتقل شدند. در این آزمون از گیاهچه‌های که با جدایه وحشی ۵۱۰ آلووده شده بود، به عنوان شاهد مثبت و از گیاهچه تیمار شده با آب مقطر استریل به عنوان شاهد منفی استفاده شد. بعد از یک هفته علائم ناشی از سرمآزادگی بر روی بعضی از برگ‌های گیاهچه‌ها ظاهر شد. این علائم شامل آب سوختگی برگ‌ها بود. رنگ برخی از برگ‌ها قهقهه‌ای تیره شد که می‌تواند حاکی از بیماری زایی باکتری

شیکر با تکان ملایم قرار گرفت. باقی مانده EMS سلول شستشو داده شد. رسوب نهایی در یک میلی‌لیتر محیط پایه مجدد سوسپانسیون و به مدت ۴ ساعت در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد رشد داده شد. به منظور کاهش جمعیت در هر پتری، برای جداسازی راحت‌تر موتان‌ها، سوسپانسیون با آب مقطر استریل رقیق شد و روی محیط معرف جامد فلورسنس KB کشت داده شد تا پس از ۴۸ ساعت رشد در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، گلنی‌های موتان یافته به دست آمد (1983) Lindow ۱۰۱ و ۵۱۰ از باکتری شبه *P. viridiflava* به ترتیب در دمای ۶-۱۰ و ۵- درجه سانتی‌گراد دارای فعالیت هسته یخ بودند. این آزمون در سه تکرار با نتایج مشابه انجام شد. جدایه‌های ۱۰۱ و ۵۱۰ باکتری شبه *Pseudomonas viridiflava* که دارای فعالیت هسته یخ در مرحله رشد لگاریتمی تحت تیمار EMS در دو دوز ۲۰ و ۲۵ میکرولیتر در میلی‌لیتر قرار داده شدند. برای حذف EMS، سلول‌ها شستشو و سلول‌ها در رقت‌های بسیار پایین، رشد داده شدند. گلنی‌های رشد یافته در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت، برای انتخاب جهش یافته‌های قادر هسته یخ با آزمون PCR با آغازگر *inaC* مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعضی از گلنی‌ها با آغازگر تولید باند کردند که برخی از این باندها مانند باند والدینی و بعضی دیگر متفاوت از باند والدینی بودند. تعدادی از این گلنی‌ها نیز با آغازگر *inaC* نتوانستند باندی تولید کنند که به احتمال قوی نشانگر ایجاد جهش در ژن *ice* این گلنی‌ها بود (شکل ۱). سوسپانسیون کدری از گلنی‌های جهش یافته بر روی گیاهچه‌های چند برگی پرتقال رشد یافته در محیط پایه MS، اسپورپاشی شد و سپس گیاهچه‌ها به مدت ۱۰-۷ ساعت در دمای حدود ۱۰- درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. بعد از این گیاهچه‌ها برای سازگار شدن به محیط گرم ابتدا به یخچال انتقال داده شده و پس از دو روز به محیط گلخانه منتقل شدند. در این آزمون از گیاهچه‌های که با جدایه وحشی ۵۱۰ آلووده شده بود، به عنوان شاهد مثبت و از گیاهچه تیمار شده با آب مقطر استریل به عنوان شاهد منفی استفاده شد. بعد از یک هفته علائم ناشی از سرمآزادگی بر روی بعضی از برگ‌های گیاهچه‌ها ظاهر شد. این علائم شامل آب سوختگی برگ‌ها بود. رنگ برخی از برگ‌ها قهقهه‌ای تیره شد که می‌تواند حاکی از بیماری زایی باکتری

هسته یخ تکثیر یافته باشد ولی به خاطر این که با این آغازگر امکان تکثیر نداشت ما پی به وجود آن نبردیم. به همین دلیل وجود ژن هسته یخ در این جدایه‌ها باعث بروز علائم سرمآذگی شد. Gibson et al. (2001) نشان دادند که علائم ناشی از سرمآذگی شامل پیدایش رنگ قهوه‌ای و یا خاکستری می‌باشد. در ابتدا بافت برگی تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما وقتی گیاه آسیب شدیدی ببیند، ممکن است ساقه و تنهاش نیز آسیب ببینند. در گیاه تیمار شده با باکتری نوع وحشی ۵۱۰ علاوه بر آسیب دیدن برگ‌ها، ساقه نیز مورد صدمه قرار گرفت.

منابع

- Edwards AR, Van Den Bussche RA, Wichman HA, Orser CS (1994) Unusual pattern of bacterial ice nucleation gene evolution. *Molecular Biology and Evolution* 11:911-920.
- Gibson R, Kelly J, Wright G (2001) Dealing with freeze damaged landscape plants. *Journal of Agricultural Life Scientist of Arizona University*.
- Keykhasaber M, Rahimian H, Babaeian Jelodar N, Bolouri Moghaddam M (2007) Production of ice nucleation deficient (Ice⁻) mutants of the epiphytic strains of *Erwinia herbicola*. *Iranian Journal of Biotechnology* 5:153-157 (in Farsi).
- Klement Z, Farkas GL, Lovrekovich L (1964) Hypersensitivity reaction induced by phytopathogenic bacteria in the tobacco leaf. *Phytopathology* 54:474-477.
- Lelliott RA, Billing E, Hayward AC (1966) A determinative scheme for the fluorescent plant pathogenic *pseudomonads*. *Journal of Applied Bacteriology* 29:470-89.
- Lindow SE (1983) Methods of preventing frost injury caused by epiphytic ice nucleation active bacteria. *Plant Disease* 67:327-333.
- Maki LR, Galyan EL, Chang-Chien MM, Caldwell DR (1974) Ice nucleation induced by *Pseudomonas syringae*. *Applied Microbiology* 28: 456-460.

کرده است. در بررسی اثر موتانت‌های ژنتیکی و فنوتیپی بر روی گیاهچه‌های پرتوصال حاصل از کشت بافت دیده شد که بعضی از چهش‌یافته‌ها نتوانستند سرمآذگی در گیاه را تشدید کنند. در صورتی که برخی دیگر با گذشت یک هفته علائم سرمآذگی را نشان دادند و در هفته دوم این علائم در بعضی‌ها شدت گرفته و در سایرین این علائم تغییر چندانی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد که در این موتانت‌ها احتمالاً جهش فقط در نواحی تکثیر شده توسط آغازگرها رخ داده ولی بیان قسمت‌های دیگر ژن هسته یخ و بیان پروتئین‌های هسته یخ دچار اختلال نشده است. یعنی قطعات تکثیر شده توسط جفت آغازگر *inaC*, کل ژن هسته یخ این جدایه‌ها را نمی‌توانست پوشش دهد، شاید قسمتی از ژن

- Marco M, Lindow SE, Quantification of biological ice nuclei from the *inaZ* reporter gene, the droplet freezing method in: Loper JE, Lindow SE (1997) Reporter gene systems useful in evaluating *in situ* gene expression by soil-and plant-associated bacteria. pp.482-492. In: Christon Journal Hurst (ed), *Manual of Environmental Microbiology* ASM Press. Washington, DC.
- Murashige T, Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiologiae Plantarum* 15:473-497.
- Obata H, Ttakeuchi S, Tokuyama T (1990) Release of cell-free ice nuclei from *Pseudomonas viridisflava* with a triton X-100/EDTA system and their ice nucleation properties. *Journal of Ferment Bioengineering* 70:308-312.
- Pourmoayyed P (2005) Inactivation of ice nucleation activity in strains epiphytic *Pseudomonas fluorescens* and *Pseudomonas syringae*. M.S. Thesis. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (in Farsi).
- Rouhrazi K, Rahimian H (2011) Bacterial leaf spot disease of sleepy marshmallow caused positive Levan strains of *Pseudomonas viridisflava*. *Journal of Plant Diseases* 47:39-55 (in Farsi).
- Warren G, Corotto L, Wolber P (1986) Conserved repeats in diverged ice nucleation structural genes from two species of *Pseudomonas*. *Nucleic Acids Research* 14:8047-8060.
- Wolber PK (1992) Bacterial ice nucleation. *Advances Microbial Physiology* 34:205-237.